

## **Состав**

*действующие вещества:* ментол (левоментол), анисовое масло, настойка перца;

*5 мл раствора содержат:* ментола (левоментола) 1,0 мг анисового масла 0,0035 мл настойки перца 0,025 мл;

*вспомогательные вещества:* масло имбиря, масло гвоздичное, масло мяты перечной, глицерин, глюкозы раствор, сахароза, трагакант, бензойная кислота (E 210), карамель (E 150), настойка бензоина, толуанский бальзам, этанол 90%, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Раствор для приема внутрь.

*Основные физико-химические свойства:* сироп темно-коричневого цвета с запахом этанола и ментола.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05X.

## **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат растительного происхождения, применяется при простудных заболеваниях дыхательных путей. Препарат проявляет муколитическое, бронхолитическое, отхаркивающее, противовоспалительное, успокаивающее и потогенное действие.

Ментол оказывает спазмолитическое, антисептическое, местноанестезирующее действие, способствует очищению дыхательных путей от слизи. Анисовое масло имеет отхаркивающие свойства, спазмолитическое и антибактериальное действие. Настойка перца оказывает отвлекающий эффект.

## **Фармакокинетика**

Данные отсутствуют.

## **Показания**

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся болью в горле, кашлем, насморком и

воспалением слизистых оболочек.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Взаимодействие не описано.

### **Особенности применения**

С осторожностью применять больным сахарным диабетом, так как препарат в своем составе содержит сахарозу, глюкозу. Не применять пациентам с непереносимостью фруктозы, глюкозы-сахарозы, сахарозы-изомальтозы.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не оказывает снотворного эффекта, не влияет на способность управлять автотранспортом или работе с механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью после оценки врачом соотношения польза/риск.

### **Способ применения и дозы**

*Применять внутрь.*

*Взрослым и детям старше 12 лет - по 2 чайные ложки (10 мл) каждый час или по 3 чайные ложки (15 мл) каждые 2-3 часа.*

*Детям 6-12 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) каждый час или по 2 чайные ложки (10 мл) каждые 2-3 часа.*

*Детям в возрасте 3-6 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) каждые 2:00.*

Перед применением бутылочку встряхнуть.

Не применять более 6 доз в течение суток. Курс лечения составляет 14 дней.

Пациентам пожилого возраста назначать такие же дозы, что и для взрослых.

## **Дети**

Противопоказан детям в возрасте до 3 лет.

## **Передозировка**

Случаи передозировки не описаны.

## **Побочные реакции**

У лиц с индивидуальной непереносимостью любого компонента препарата возможны желудочно-кишечные расстройства, реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд.

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С.

## **Упаковка**

По 100 мл в бутылке; по 1 бутылке в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

Белл Санз & Компани (Драггистс) Лимитед.  
Bell Sons & Company (Druggists) Limited.

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Гиффорд Хаус, Слейдберн Кресцент, Саутпорт, PR9 9AL, Великобритания.  
Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, PR9 9AL, United Kingdom.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).