

## **Состав**

*действующие вещества:* 2,4-дихлорбензиловый спирт, амилметакрезол; левоментол;

1 леденец содержит 2,4-дихлорбензинового спирта 1,2 мг, амилметакрезола 0,6 мг, левоментола 8 мг

*вспомогательные вещества:* масло эвкалиптовое, кислота винная, индиго (Е 132), сахарозы раствор, глюкозы раствор.

## **Лекарственная форма**

Леденцы.

*Основные физико-химические свойства:* округлые леденцы голубого цвета с тиснением знака «S» с обеих сторон.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.

Код АТХ R02A A20.

## **Фармакодинамика**

Препарат обладает антисептическими свойствами. Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов; оказывает противогрибковое действие. Эффективность препарата обусловлена наличием двух антибактериальных компонентов широкого спектра действия, облегчающие боль в горле.

Левоментол и масло эвкалиптовое уменьшают отек слизистой оболочки ротовой полости и носоглотки.

## **Фармакокинетика**

В связи с незначительной абсорбцией в кровь препарат относится к средствам местного применения. Учитывая это, фармакокинетические показатели не определялись.

## **Показания**

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки первых симптомов простуды, сопровождающихся болью в горле и заложенностью носа.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Исследование взаимодействия не проводили.

### **Особенности применения**

Не следует превышать указанную максимальную дозу.

Если симптомы продолжаются в течение 3 дней, необходимо обратиться к врачу для дополнительной корректировки схемы лечения.

Больным с наследственными редкими заболеваниями, сопровождающиеся непереносимостью фруктозы, при глюкозо-галактозы мальабсорбции или сахарозно-изомальтозной недостаточности не следует применять этот препарат. Больные сахарным диабетом должны учитывать, что 1 леденец содержит приблизительно 2,6 г сахара.

Пациентам с сахарным диабетом не следует принимать Стрепсилс® с Ментолом и Евкалиптом.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Влияние на способность управлять автотранспортом или другими механизмами отсутствует или является несущественным.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

*Беременность.* Данные по применению амилметакрезола и 2,4-дихлорбензилового спирта отсутствуют или ограничены. Как и в случае со всеми другими лекарственными средствами, следует соблюдать осторожность при применении этого препарата в период беременности и в случае необходимости — обратиться за советом врача.

*Кормление грудью.* Неизвестно, проникает ли 2,4 дихлорбензиловый спирт, амилметакрезол или метаболиты в грудное молоко. Нельзя исключать риска для новорожденных/младенцев.

*Фертильность.* Данные о влиянии на фертильность отсутствуют.

## **Способ применения и дозы**

Для орального применения.

Рекомендуется взрослым и детям старше 6 лет по 1 леденцу каждые 2-3 часа. Леденец необходимо медленно рассасывать до его полного растворения. Не применять более 12 леденцов в течение 24 часов. Максимальная рекомендованная продолжительность применения препарата - 3 дня. Не нужно корректировать дозу пациентам пожилого возраста.

## **Дети**

Учитывая лекарственную форму, лекарственное средство противопоказано детям до 6 лет.

## **Передозировка**

В маловероятном случае передозировки серьезные побочные эффекты не ожидаются. Может ощущаться некоторый дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта. Лечение симптоматическое.

## **Побочные реакции**

Следующие побочные реакции наблюдались при кратковременном применении 2,4-дихлорбензинового спирта и амилметакрезола в безрецептурных дозах. При лечении хронических заболеваний и при длительном применении могут возникнуть другие побочные реакции.

Побочные реакции классифицированы по системам органов и частоте. Частота определяется следующим образом: очень часто  $\geq 1/10$ ; часто:  $\geq 1/100$  и  $< 1/10$ ; нечасто  $\geq 1/1000$  и  $< 1/100$ ; редко  $\geq 1/10000$  и  $< 1/1000$ ; очень редко  $< 1/10000$ ; неизвестно (нельзя оценить по имеющимся данным). В каждой группе частоты побочных реакций приводятся в порядке убывания степени серьезности.

*Со стороны иммунной системы.*

Нечасто: реакции гиперчувствительности, включая сыпь, крапивницу, зуд, бронхоспазм, анафилаксию, эритема.

*Со стороны дыхательных путей и органов средостения.*

Нечасто: фарингальный отек (отек горла).

*Со стороны пищеварительного тракта.*

Нечасто: ощущение дискомфорта в полости рта (жжение во рту), раздражение горла (жжение в гортани), парестезии ротовой полости (пощипывание во рту), отек полости рта. Редко: глосодиния (болезненность языка). Очень редко: диспепсия, тошнота, стоматит. Неизвестно: боль в животе.

*Со стороны кожи и подкожной клетчатки.*

Неизвестно: высыпания на коже, зуд, крапивница, эритема.

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 12 леденцов в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Реккитт Бенкизер Хелскер Интернешнл Лимитед.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Ноттингем сайт, Тейн Роуд, Ноттингем, NG90 2DB, Великобритания

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).