Состав

действующее вещество: плюща обыкновенного листьев экстракт сухой;

1 мл сиропа содержит 7 мг плюща обыкновенного листьев экстракта сухого (Hederae helicis e folium), (4-8: 1), экстрагент: этанол 30%;

вспомогательные вещества: калия сорбат (Е 202) кислота лимонная моногидрат (Е 330) ксантановая камедь (Е 415) ароматизатор лимонный; сорбитол жидкий, не кристаллизуется (Е 420) вода очищенная.

2,5 мл сиропа содержат 0,963 г сахарозаменительного вещества сорбита = 0,080 ХЕ.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: желто-коричневый сироп с характерным запахом лимона. Допускается наличие осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Код АТХ R05C A12.

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения, содержит гликозидные сапонины, который вызывает отхаркивающее, спазмолитическое, бронхолитическое, противовоспалительное и противомикробное действия. Основными компонентами сухого экстракта листьев плюща являются сапонины тритерпеновые, главным образом гедеракозид С и альфа-гедерин.

Альфа-гедерин подавляет эндоцитоз β2-адренорецепторов, что увеличивает активность β2-адренергических клеток в слизистой оболочке бронхов и эпителии легких. Это приводит к уменьшению внутриклеточных уровней кальция в слизистой оболочке бронхов, вызывает расслабление бронхов. Благодаря стимулированию β2-адренорецепторов альвеолярные эпителиальные клетки типа II образуют больше сурфактанта. Таким образом, ХЕДЕРАЛ® Плющ снижает вязкость мокроты, облегчает отхаркивание и кашель.

Показания

- Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающихся кашлем;
- симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или к другим растениям семейства аралиевых.

Возраст до 2 лет (из-за риска ухудшения дыхательных симптомов).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении ХЕДЕРАЛ® Плющ и других лекарственных средств побочного действия не наблюдалось. Поэтому препарат можно применять вместе с другими лекарственными средствами, например с антибиотиками.

Не рекомендуется без консультации врача одновременное применение с противокашлевыми препаратами, такими как кодеин или декстрометорфан.

Особенности применения

Если беспокоит одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом. С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвой желудка.

Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей. В случае установленной непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат. Может оказать мягкое слабительное действие.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды.

Способ применения и дозы

Сироп ХЕДЕРАЛ® Плющ следует применять утром, днем и вечером. Препарат следует принимать независимо от приема пищи.

Возрастная группа	Дозировка и кратность приема
Взрослые и дети от 10 лет	по 5 – 7,5 мл 3 раза в сутки
Дети в возрасте от 6 до 10 лет	по 5 мл 3 раза в сутки
Дети в возрасте от 2 до 6 лет	по 2,5 мл 3 раза в сутки

Дозировка осуществляют с помощью мерного стаканчика, который прилагается.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. В легких случаях длительность лечения составляет 1 неделю. Для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуют продолжать терапию еще 2 - 3 суток после улучшения состояния пациента.

Перед применением необходимо тщательно взбалтывать содержимое флакона!

Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу относительно дальнейшего лечения.

Дети

Противопоказан детям до 2 лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов.

Применение препарата у детей в возрасте 2 - 4 года требует рекомендации врача.

Передозировка

Симптомы: передозировка может спровоцировать тошноту, рвоту, диарею, чувство тревоги и возбуждения.

Лечение: симптоматическое.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (преимущественно сыпь, крапивница, отек Квинке, зуд), купероз, одышка, а также желудочно-кишечные расстройства (включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе).

В случае возникновения нежелательных реакций следует прекратить лечение и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

После вскрытия флакона препарат можно применять в течение 3-х месяцев.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 115 мл сиропа во флаконе; по 1 флакону с мерным стаканчиком в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «ВИТАМИНЫ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 20300, Черкасская обл., Г.. Умань, ул. Успенская, 31.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.