

## **Состав**

*действующее вещество:* настойка из лекарственного растительного сырья: адониса весеннего травы (Herba adonidis vernalis), можжевельника обыкновенного плодов (Fructus juniperi communis), арники цветков (Arnicae flos), мяты листья (Menthae piperitae folium);

1 флакон капель содержит настойки из лекарственного растительного сырья (1:12,5): горицвета весеннего травы (Herba adonidis vernalis), можжевельника обыкновенного плодов (Fructus juniperi communis), арники цветков (Arnicae flos), мяты листья (Menthae piperitae folium ) (экстрагент - этанол 40%) - 50 мл;

1 мл препарата содержит 0,35 мл этанола.

## **Лекарственная форма**

Капли для перорального применения.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная жидкость светло-коричневого цвета с приятным запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Кардиологические препараты. Код АТХ С01Е Х.

## **Фармакодинамика**

При функциональных сердечных расстройствах препарат оказывает кардиопротекторное и антиоксидантное действие.

Кардиолин - комбинированный препарат, содержащий вытяжку из лекарственных растений: травы горицвета весеннего, которая оказывает легкое диуретическое, седативное действие и имеет антиаритмические свойства; плодов можжевельника обыкновенного, имеющих диуретическое воздействие; арники цветков, которые имеют кардиопротекторную активность; мяты листья, проявляют умеренное спазмолитическое, седативное, желчегонное действие.

Препарат положительно влияет на обмен веществ в миокарде, печени, в частности подавляет процессы перекисного окисления липидов, повышает активность антиоксидантных ферментов, энергетический баланс клеток, стимулирует синтез адениловых нуклеотидов, гликогенолиз, повышает активность ряда ферментов цикла Кребса.

Препарат оказывает легкое седативное действие, уменьшает проявления дизэнцефальных нарушений, улучшает переносимость физических нагрузок, способствует повышению работоспособности.

## **Показания**

В комплексном лечении нейроциркуляторной дистонии, неврозов сердца, ишемической болезни сердца (стенокардия напряжения I-II ФК).

## **Противопоказания**

Депрессия, алкоголизм в анамнезе, одновременное применение препаратов, содержащих спирт, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, цирроз печени, прием нейролептиков и транквилизаторов, повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженная брадикардия, блокада, гликозидная интоксикация, WPW-синдром, тяжелые заболевания почек.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Нежелательно совместное применение с сердечными гликозидами, так как препарат содержит траву адониса и возможные проявления токсичности.

Поскольку препарат Кардиолин содержит спирт этиловый 40% и траву горичвета, возможно потенцирование действия снотворных препаратов, транквилизаторов, седативных средств, нейролептиков, а также препарат может усиливать кардиотоническое эффект и токсичность сердечных гликозидов.

При одновременном применении с Противоаритмические средствами класса IA (хинидин, прокаинамид, дизопирамид), препаратами кальция, слабительными средствами и ГКС усиливается их эффект и токсическое действие.

## **Особенности применения**

Во время лечения следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Больным с гастроэзофагеальных рефлюксом не следует применять препарат, так как может усиливаться изжога.

Больным с желчнокаменной болезнью и другими заболеваниями желчевыводящих путей применять препарат следует с осторожностью.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

В период применения препарата запрещается управлять автомобилем и работать с потенциально опасными механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применение противопоказано.

## **Способ применения и дозы**

Взрослым внутрь по 20-30 капель 2-3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. Препарат можно разводить водой в соотношении 1: 3 или 1: 5.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально; средняя продолжительность - 20-30 дней.

## **Дети**

Опыта применения у детей нет.

## **Передозировка**

При значительном повышении дозы возможно сонливость, диспепсические расстройства, аллергические реакции, требующие отмены препарата и проведения симптоматической терапии.

## **Побочные реакции**

Кардиолин может вызвать проявления гиперчувствительности, диспепсические расстройства, тошнота, рвота, боль в животе, запор, диарею, сонливость, усиление диуреза, потливость, озноб.

## **Срок годности**

2 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте. Во время хранения возможно выпадение осадка.

### **Упаковка**

По 50 мл во флаконе. По 1 флакону в пачке из картона.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО «Биолек».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 24321, Винницкая обл., Г.. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).