

Состав

действующие вещества: 2,2 мл раствора содержат: Acidum alpha-ketoglutaricum D8 - 22 мг, Acidum arsenicosum D8 - 22 мг, Acidum fumaricum D8 - 22 мг, Acidum L (+) - lacticum D6 - 22 мг, Acidum malicum D8 - 22 мг, Arnica montana D4 - 22 мг, Carbo vegetabilis D18 - 22 мг, Cor suis D8 - 22 мг, Crataegus D6 - 22 мг, Hepar suis D8 - 22 мг, Kalium carbonicum D4 - 22 мг, Kalmia latifolia D4 - 22 мг, Natrium diethyloxalaceticum D8 - 22 мг, Nitroglycerinum D4 - 22 мг, Ouabainum D8 - 22 мг, Ranunculus bulbosus D6 - 22 мг, Selenicereus grandiflorus D3 - 22 мг, Spigelia anthelmia D10 - 22 мг, Strychnos ignatii D6 - 22 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат

Фармакодинамика

Препарат ангиопротекторного, антиаритмического, кардиотрофического, кардиотонического, спазмолитического и гипотензивного действий.

Действие лекарственного средства основано на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в его состав.

Фармакокинетика

Показания

В комплексном лечении ишемической болезни сердца: при атеросклерозе коронарных сосудов, состоянии после перенесенного инфаркта миокарда; при сердечной недостаточности, сердечной аритмии, гипертонической болезни, кардиомиопатии, кардиодистрофии, эндокардите, стенокардии, хронической ревматической болезни сердца, гипертрофии миокарда, при эмфиземе легких,

легочном сердце, нарушении легочного кровообращения, облитерирующий эндартериит, гастрокардиальном синдроме.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно. При применении любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом относительно возможности одновременного применения.

Особенности применения

Если пациент страдает от серьезной болезни сердца, следует посоветоваться с врачом перед началом применения лекарственного средства. Если пациент чувствует одышку или боль в области сердца, может распространяться на руки, верхний отдел брюшной полости или горло, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного можно изменять длительность курса лечения и способ применения.

В начале лечения возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение лекарственного средства следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Вопрос о целесообразности применения лекарственного средства в период беременности и кормления грудью решается индивидуально врачом с учетом риска/пользы.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым - 1 ампула по 2,2 мл. Применять в виде внутримышечных, подкожных, внутрикожных, при необходимости - внутривенных (струйно и капельно) инъекций, а также инъекций в акупунктурные точки 1-3 раза в неделю.

Курс лечения - 4-6 недель.

Как открыть ампулу

Открывать осторожно. Разрезать стеклянную ампулу не обязательно. Держите ампулу верхней частью вверх под наклоном; жидкость, которая находится в верхней части ампулы, встряхните вниз. Отломите верхнюю часть ампулы, где находится цветная отметка. Неиспользованный остаток раствора вылить.

Дети

Препарат не применять детям.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

В редких случаях могут возникать временные аллергические реакции.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня указанного месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

5 ампул по 2,2 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).