Состав

действующие вещества: экстракт сложный отхаркивающее;

1 мл препарата содержит спиртовой экстракт корня девясила (Extractum Inulae fluidum) (1: (6-7)) 0,27 г спиртовой экстракт цетрарии исландской (Extractum Cetraria fluidum) (1:20) 0,18 г настойку корня мыльнянки (Tinctura Saponariae) (1:5) 0,09 г настойку травы иссопа (Tinctura Hyssopi) (1:5) 0,18 г настойку травы тимьяна (Tinctura Thyme) (1:5) 0,18 г;

вспомогательные вещества: глицерин.

Лекарственная форма

Экстракт жидкий.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость коричнево-желтого цвета со специфическим запахом. При хранении допускается образование хлопьевидного осадка или мути.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Комбинации. Код АТХ R05C A 10.

Фармакодинамика

Фармакологическая активность препарата обусловлена совокупным эффектом физиологически активных веществ, входящих в состав отдельных компонентов растительного сырья. Экстракты из корня девясила, травы иссопа, травы тимьяна содержат эфирные масла, стимулирующие двигательную активность ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей, оказывают отхаркивающее действие, а также обладают противовоспалительными и антимикробными свойствами. Кроме того, экстракт травы тимьяна оказывает спазмолитическое действие на гладкие мышцы бронхов. Экстракт из цетрарии исландской оказывает обволакивающее, противовоспалительное и антимикробное действия. Экстракт корня мыльнянки содержит сапонины, которые оказывают отхаркивающее действие.

Фармакокинетика

После приема внутрь эфирные масла, входящие в состав препарата, практически полностью всасываются в тонком кишечнике и с током крови попадают в легкие, обусловливая фармакологическое действие. Выведение эфирных масел осуществляется преимущественно легкими путем перспирации.

Показания

В составе комплексного лечения острых респираторных заболеваний, бронхитов и заболеваний легких, сопровождающихся затрудненным выделением мокроты, кашлем, в том числе сухим, болезненным.

Противопоказания

Воспалительные заболевания желудка и кишечника, желудочно-кишечные кровотечения, состояние после операций на органах желудочно-кишечного тракта, в том числе на печени и мочевыводящих путях; тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы и почек повышенная чувствительность к компонентам препарата и к растениям семейства губоцветных (Lamiaceae), а также к сельдерею и пыльцы березы (возможна перекрестная реакция) детский возраст до 12 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не описаны.

Особенности применения

Если во время лечения ухудшается симптоматика и/или появляются одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом. Если в течение одной недели симптоматика сохраняется, необходимо проконсультироваться с врачом.

Это лекарственное средство содержит 60 об.% Этанола (алкоголя), то есть 189,6 мг/доза (для дозы 10 капель), что эквивалентно 4,8 мл пива, 1,66 мл вина в дозе. Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении детям старше 12 лет и пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

При применении в терапевтических дозах не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Результаты современных клинических исследований применения действующих веществ в период беременности и кормления грудью отсутствуют, поэтому применять препарат в эти периоды не рекомендуется (лекарственное средство содержит 60 об.% этанола).

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, после еды, 3 раза в сутки, предварительно растворив его в 20-50 мл воды.

Дети 12-13 лет - 10-15 капель на один прием.

Дети 14-16 лет - 15-20 капель на один прием.

Взрослые и дети от 16 лет - 20-30 капель на один прием.

Продолжительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания, сопутствующей комплексной терапии, достигнутого эффекта и составляет в среднем 10-15 дней.

Дети

Безопасность и эффективность применения препарата у детей в возрасте до 12 лет не установлены, поэтому таким пациентам его назначать не рекомендуется.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочного действия препарата.

Лечение: симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Возможны желудочно-кишечные расстройства (включая спазмы, тошноту, рвоту, диарею) сердечно-сосудистые нарушения (брадикардия, гипотония) у больных с сердечной недостаточностью. Аллергические реакции (в том числе сыпь, гиперемия кожи, крапивница, ангионевротический отек, аллергический дерматит, анафилактический шок).

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл во флаконе. По 1 флакону в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Фармак».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.