

Состав

действующее вещество: боярышника листья и цветки (Crataegi folia et flores);

1 пачка содержит боярышника листьев и цветков (Crataegi folia et flores) 50 г.

Лекарственная форма

Листья и цветки.

Основные физико-химические свойства: порошок крупный: смесь кусочков листьев, цветков, бутонов, лепестков, цветоножек, тычинок, черенков, веточек разной формы зеленого, красно-коричневого, коричневато-красного или буровато-красного, коричневого или серо-коричневого, от ярко-зеленого до темно-зеленого , серо-зеленого, буровато-белого или желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Кардиологические препараты. Код ATX C01E B04.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают кардиотоническое, спазмолитическое, гипотензивное и успокаивающее действие; улучшают работу сердечной мышцы, устраниют нарушения ритма сердечных сокращений, усиливают кровообращение в коронарных сосудах сердца и сосудах головного мозга, нормализуют артериальное давление, снижают проницаемость стенок кровеносных сосудов и капилляров, способствуют снижению уровня холестерина в крови.

Показания

Функциональные расстройства сердечной деятельности, ангионеврозы, легкие формы аритмий, начальные стадии артериальной гипертензии - в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Выраженные артериальная гипотензия и брадикардия гиперчувствительность к биологически активных веществ препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Усиливает действие снотворных, седативных и антиаритмических средств, сердечных гликозидов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

На период лечения следует воздержаться от управления автотранспортом или работы с механизмами, поскольку возможно возникновение сонливости.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку листьев и цветков поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде взрослым по $\frac{1}{3}$ стакана 3 раза в день за 15-20 мин до еды, детям старше 14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана 2-3 раза в день за 15-20 мин до еды. Перед применением настой взболтать.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °C не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 14 лет.

Передозировка

При передозировке возникают сонливость, уменьшение частоты сердечных сокращений, снижение артериального давления. При возникновении данных симптомов следует прекратить прием препарата, терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи). При длительном применении может появиться сонливость, уменьшение частоты сердечных сокращений.

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °C в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.