

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 таблетка содержит экстракт травы термопсиса ланцетного сухой (экстрагент - этанол 25%) 0,043 г, натрия гидрокарбонат 0,2 г

*вспомогательные вещества:* натрия бензоат (Е 211), аммония хлорид, крахмал картофельный, тальк.

## **Лекарственная форма**

Таблетки.

*Основные физико-химические свойства:* таблетки от светло-желтого, светло-бурого до желто-бурого цвета, допускается сероватый оттенок, с вкраплениями, с насечкой для деления.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях.

Код АТХ R05X.

## **Фармакодинамика**

Екстратерм® - комбинированный препарат, который обладает отхаркивающим, противокашлевым и противовоспалительным действиями.

Термопсис усиливает секрецию бронхиальных желез. Алкалоиды (цитизином, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин и термопсидин), содержащиеся в термопсисе, оказывают возбуждающее действие на дыхательный центр.

Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствуя снижению вязкости мокроты.

## **Показания**

Симптоматическое лечение кашля (особенно при затрудненном отхождении мокроты) при заболеваниях дыхательных путей, таких как: трахеит, бронхит, бронхопневмония.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Острый гломерулонефрит, острый пиелонефрит; язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, язвенная болезнь желудка, кровохарканье. Возраст до 12 лет.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов травы термопсиса в желудочно-кишечном тракте. Таблетки от кашля не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин, и другими препаратами, которые подавляют кашель.

### **Особенности применения**

Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется применение большого количества теплой жидкости.

Это лекарственное средство содержит 3,8 ммоль / дозу натрия. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, которые применяют натрий-контролируемую диету.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применение в период беременности или кормления грудью противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям старше 12 лет принимать внутрь по 1 таблетке 3-4 раза в сутки.

Перед применением таблетку желательно растворить в 1/4 стакана кипяченой воды с температурой около 40 ° С, помешивая, или запить таблетку таким же количеством воды. Продолжительность лечения зависит от течения заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и определяется врачом.

### **Дети**

Не применять лекарственное средство детям до 12 лет.

### **Передозировка**

Тошнота, рвота, слабость, диарея, головокружение, холодный пот, бледность, синюшность слизистых оболочек, при тяжелом отравлении возможны нарушения сознания, возбуждение, галлюцинации, судороги.

Лечение - промывание желудка, солевые слабительные, активированный уголь, симптоматическая терапия.

### **Побочные реакции**

Аллергические реакции, в том числе гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи.

*Со стороны пищеварительного тракта:* тошнота, гастрит, рвота, диарея.

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 12 таблеток в блистере, по 1 блистера без пачки или по 2 блистера в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ПрАО «ФИТОФАРМ».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 02152, г.. Киев, проспект Павла Тычины, дом 1В, офис А 504.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).