

## **Состав**

15 мл сиропа содержит:

*действующие вещества:* экстракт жидкий сложный (1: 4,4) - 1,0 г, изготовлен из: листья подорожника ланцетного (*Plantaginis lanceolatae folio*), травы гринделии (*Grindeliae herba*), плодов шиповника (*Rosae fructus*) (3: 1: 1 ) (экстрагент - этанол 50% (об / об)) экстракта травы чабреца (*Thymi herbae extractum*) (1: 4) - 0,6 г (экстрагент - этанол 30% (об / об), глицерин, вода аммиачная 25% ) сока из травы эхинацеи пурпурной (*Echinaceae purpureae herbae succus*) (1: 1) - 0,4 г, (экстрагент - этанол 96% (об/об), вода очищенная);

*вспомогательные вещества:* концентрат смородины черной, сахароза, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Сироп.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная сироп красно-коричневого цвета, с запахом смородины и чабреца, допускается опалесценция.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комбинированные средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях.

Код АТХ R05X.

## **Фармакодинамика**

Иммуностимулирующее, противовоспалительное, отхаркивающее средство. Главное действие препарата - размягчения густого и вязкого секрета, который находится в дыхательных путях, возбуждение и активация отхаркивающего рефлекса (*Grindelia robusta* L., *Plantago lanceolata* L.). Для вышеуказанных компонентов препарата характерно противовоспалительное и антибактериальное действие. Экстракт из плодов шиповника применяется при мягких формах катара верхних дыхательных путей. Сок из травы эхинацеи пурпурной активизирует иммунные процессы.

## **Фармакокинетика**

Не исследовались.

## **Показания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, к цветам семейства сложноцветных, губоцветных. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, включая рефлюкс-эзофагит, гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, тяжелые заболевания печени или почек. Туберкулез, ревматизм, системные заболевания соединительной ткани (коллагенозы), рассеянный склероз, другие аутоиммунные заболевания, хронические вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция/СПИД, новообразования, первичный иммунодефицит, иммуносупрессия, заболевания лейкоцитарной системы крови (лейкоз, агранулоцитоз). Тромбофлебит и склонность к нему, недостаточность кровообращения, эндокардит, декомпенсированный сахарный диабет, тяжелые заболевания почек, желчнокаменная болезнь.

## **Противопоказания**

Применяют в комплексном лечении воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, бронхита на фоне ослабления защитных функций организма; с целью профилактики при пониженном иммунитете.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Вследствие иммуностимулирующего действия эхинацея может уменьшать эффективность препаратов, оказывающих иммунодепрессивное действие.

Ехинасаль не рекомендуется применять одновременно с препаратами с гепатотоксическим действием, такими как амиодарон, метотрексат, кетоконазол, стероидные препараты. Препарат содержит этанол, который может повышать абсорбцию и фармакологическое действие некоторых седативных препаратов и опосредованно, изменяя активность системы цитохрома P450, влиять на элиминацию лекарственных средств, метаболизирующихся при участии ферментов этой системы. Этанол может вызвать дисульфирамоподобную реакцию при одновременном применении, например, с некоторыми антибактериальными средствами.

Не применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими выделение мокроты.

## **Особенности применения**

Если у вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Пациенты с редкими генетическими нарушениями, связанными с непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы или дефицитом сахароз-изомальтазы, не должны принимать препарат. Лекарственное средство содержит сахарозу, что следует учитывать больным сахарным диабетом.

Препарат содержит спирт, поэтому существует риск для пациентов, больных алкоголизмом. Алкоголь не рекомендуется для приема женщинам в период беременности и кормления грудью, детям и пациентам с повышенным риском развития печеночной недостаточности или эпилепсии.

Если заболевание органов дыхания имеют частые рецидивы и долговременные симптомы, которые проявляются затрудненным дыханием, лихорадкой, наличием мокроты с примесью крови или гноя, необходимо обратиться к врачу. В случае усиления симптомов заболевания или повышение температуры тела во время лечения следует немедленно обратиться к врачу.

Пациенты со склонностью к аллергии должны проконсультироваться с врачом перед приемом препарата, поскольку существует риск возникновения аллергических реакций.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Лекарственное средство в рекомендуемой дозе не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. В случае возникновения при применении препарата головокружение, нарушение сна, необходимо избегать управления автотранспортом или работы с механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Лекарственный препарат противопоказан при беременности и кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

Внутрь, независимо от приема пищи, взрослым и детям старше 12 лет.

*Детям от 12 лет и взрослым - по 1 столовой ложке (15 мл) 3-4 раза в сутки.*

Продолжительность лечения - 10 дней.

С целью профилактики следует принимать половину лечебной дозы:

*детям старше 12 лет и взрослым - по 1 столовой ложке 2 раза в день.*

Профилактическое применение препарата должно длиться не более 20 дней.

## **Дети**

Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

## **Передозировка**

Симптомы: повышенная возбудимость, нарушение сна, раздражение слизистой оболочки, желудочно-кишечные расстройства, усиление проявлений побочных реакций. Из-за содержания алкоголя возможна алкогольная интоксикация, особенно у детей.

Лечение. Симптоматическая терапия.

## **Побочные реакции**

*Со стороны иммунной системы:* реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, анафилактический шок.

*Со стороны кожи и подкожной клетчатки:* покраснение кожи, отек кожи, зуд, сыпь, крапивница, синдром Стивенса-Джонсона.

*Со стороны дыхательной системы:* бронхоспазм с обструкцией, астма, одышка.

*Со стороны нервной системы:* головокружение, нарушение сна.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* артериальная гипотензия.

*Со стороны пищеварительного тракта:* тошнота, рвота, диарея, боль в животе.

Были отдельные сообщения о возможной связи с аутоиммунными заболеваниями (диссеминированный энцефаломиелит, узелковая эритема, имунотромбоцитопения, синдром Эванса, синдром Шегрена-Ларсена с нарушением тубулярной функции почек).

При длительном применении (более 8 недель) может возникнуть лейкопения.

В случае возникновения аллергических реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

### **Срок годности**

3 года.

Срок годности после вскрытия флакона - 90 суток.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 125 г сиропа во флаконе из темного стекла в картонной упаковке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Вроцлавское предприятие лекарственных трав «ГЕРБАПОЛЬ» АО.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Ул. Ксенця Витольда 56, 50-203 Вроцлав, Польша.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).