Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат: Spigelia 200CH 20 мг, Cactus 200CH 20 мг, Kalium carbonicum 200CH 20 мг, Lachesis 1000CH 20 мг, Ignatia 1000CH 20 мг;

вспомогательные вещества: сахар кондитерский.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Уменьшает сердцебиение, боли в области сердца, способствует стабилизации артериального давления.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

В составе комплексной терапии: нейроциркуляторная дистония, неврозы с повышенной раздражительностью, артериальная гипертензия I степени.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно совместное применение с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками,

противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

Особенности применения

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахараз-изомальтазы не следует применять этот препарат.

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества - сахара кондитерского - проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у вас установлен непереносимость некоторых сахаров.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не исследовалось. Вопрос о целесообразности применения лекарственного средства беременным и кормящим грудью, врач решает индивидуально.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 7 лет - по 5 гранул под язык до полного рассасывания. Принимать при приступах боли в области сердца, усиленном сердцебиении 3-5 раз через каждые 10-15 минут до улучшения состояния. Если боль не проходит, больному следует обратиться к врачу. При постоянной боли в области сердца принимать 3-5 раз в сутки (в комплексе с другими протиангинальними лекарственными средствами).

Для профилактики принимать 1-2 раза в сутки. Курс лечения - 2-3 месяца. При необходимости курс повторить через 2-3 недели.

Детям в возрасте от 1 до 7 лет при нейроциркуляторной дистонии, сопровождающееся усиленным сердцебиением - по 3 гранулы, растворенные в небольшом количестве воды 2-3 раза в день. Продолжительность лечения врач определяет индивидуально.

Лекарственное средство следует принимать за 15-20 минут до еды или через 1 час после еды.

Дети

Не назначают детям в возрасте до 1 года.

Применение лекарственного средства детям в возрасте от 1 до 3 лет возможно только по назначению врача.

Передозировка

В большинстве случаев не приводит к негативным последствиям и не требует антидотовой терапии, но у лиц с гиперчувствительностью к компонентам препарата возможно усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 10 г в флаконе с крышкой, по 1 флакону в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — Государственного реестра лекарственных средств Украины.