

Состав

действующее вещество: настойка из листьев мяты перечной (Folium Menthae piperitae) (1:20) (экстрагент - этанол 90%);

1 флакон содержит настойки из листьев мяты перечной (Folium Menthae piperitae) (1:20) (экстрагент - этанол 90%) - 23,75 мл масла мятного - 1,25 мл.

Лекарственная форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость зеленого цвета, с запахом и вкусом перечной мяты. При хранении допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Противорвотные средства и препараты, устраняющие тошноту. Код АТХ А04А D.

Фармакодинамика

Масло мяты перечной (содержит до 70% ментола и его эфиров) и другие биологически активные вещества, содержащиеся в листьях мяты перечной (кетоны-ментон, олеаноловая и урсоловая кислоты, флавоноидные гликозиды), стимулируют чувствительные рецепторы слизистых оболочек ротовой полости и желудка, рефлекторным путем уменьшают чувство тошноты и предотвращают рвоту, а также оказывают умеренное спазмолитическое, успокаивающее и желчегонное действие.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Тошнота, рвота, расстройства пищеварения, стенокардия, невралгические боли.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Бронхиальная астма и спазмофилия.

Особые меры безопасности.

Пациентам с желудочно-пищеводного рефлюкса (изжогой) следует избегать применения препарата, поскольку может увеличиться изжога.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Поскольку в состав препарата входит этанол, следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь до еды. Взрослым и детям старше 12 лет - по 10 - 15 капель настойки 3 - 4 раза в сутки.

Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально и зависит от течения заболевания и индивидуальной чувствительности к препарату.

Дети

Не применять детям до 12 лет, поскольку в состав препарата входит этиловый спирт.

Передозировка

Нерациональное применение препаратов мяты может привести к боли в области сердца. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, контактный дерматит).

При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. При хранении возможно выпадение осадка.

Упаковка

По 25 мл в флаконах, 1 флакон в пачке или флакон без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).