

## **Состав**

*действующее вещество:* жидкий экстракт корневищ с корнями элеутерококка колючего (*Eleuterococcus senticosus*) (1: 1) (экстрагент - этанол 40%);

1 флакон содержит жидкого экстракта корневищ с корнями элеутерококка колючего (*Eleuterococcus senticosus*) (1: 1) (экстрагент - этанол 40%) 50 мл.

## **Лекарственная форма**

Экстракт жидкий.

*Основные физико-химические свойства:* жидкость темно-коричневого цвета, в тонком слое прозрачная, со специфическим запахом. При хранении допускается выпадение осадка.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Тонизирующее средство. Код АТХ А13А.

## **Фармакодинамика**

В состав элеутерококка колючего корневищ с корнями входят элеутерозидов А, В, В1, С, Д, Е, F и G, производные кумарина, флавоноиды, эфирное масло, растительный воск, смолы, крахмал и другие компоненты. Благодаря присутствию элеутерозидов препарат повышает физическую и умственную работоспособность, остроту зрения, устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды, улучшает обмен веществ, оказывает незначительное стимулирующее гонадотропную и гипогликемическое действие.

## **Фармакокинетика**

Не изучались.

## **Показания**

Физическое и умственное переутомление, неврастении и психостении, функциональное истощение центральной нервной системы, которое сопровождается снижением работоспособности, раздражительностью и бессонницей. Вегетоневрозы, послеоперационный период; в сочетании с другими средствами - при острой и хронической лучевой болезни.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипертермический синдром, артериальная гипертензия, повышенная возбудимость, эпилепсия, острые инфекционные заболевания, инфаркт миокарда, аритмии, бессонница, нейроциркуляторная дистония.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Препарат может усиливать действие средств, которые стимулируют центральную нервную систему, аналептиков, гипогликемических средств и подавлять действие седативных и снотворных препаратов.

## **Особенности применения**

При приеме препарата во второй половине дня возможна бессонница.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат содержит этанол 40%, поэтому при применении препарата следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Препарат содержит этанол 40%, поэтому не следует применять в период беременности и кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

Перед применением взболтать. Препарат назначать внутрь за 30 минут до еды.

Взрослым принимать по 20-30 капель 1 раз в сутки, детям старше 12 лет назначать из расчета 1 капля на год жизни ребенка 1 раз в сутки, предварительно развести небольшим количеством воды, в первой половине дня (то есть до 15 часов). Курс лечения составляет 25-30 дней, при необходимости повторять через 1-2 недели.

## **Дети**

Не рекомендуется применять препарат детям до 12 лет, поскольку он содержит этанол 40%.

### **Передозировка**

Возможно повышение артериального давления, нарушение сна, нарушение ритма сердца, снижение работоспособности, повышенная возбудимость.

Терапия симптоматическая.

### **Побочные реакции**

Препарат обычно хорошо переносится, однако у пациентов, имеющих гиперчувствительность, возможно развитие аллергических реакций (покраснение кожи, сыпь, зуд);

- *со стороны центральной нервной системы:* возбуждение, нарушение сна, раздражительность, тревожное состояние, снижение работоспособности;
- *со стороны сердечно-сосудистой системы:* тахикардия, повышение артериального давления.

При длительном применении (более 2 месяцев) может привести спазм мышц, нарушения со стороны пищеварительного тракта.

### **Срок годности**

4 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 50 мл, в стеклянных или полимерных флаконах.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 69063, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).