

Состав

действующие вещества: diosminum, hesperidinum;

1 таблетка содержит суммы флавоноидной фракций 500 мг диосмина в пересчете на 100% вещество 450 мг гесперидина в пересчете на 100% вещество 50 мг

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кополивидон, кремния диоксид коллоидный, натрия кроскармеллоза, магния стеарат состав оболочки: Opadry II розовый (титана диоксид (Е 171), тальк, железа оксид желтый (Е172), железа оксид красный (Е172), железа оксид черный (Е172), полиэтиленгликоль (макрогол) 4000, поливиниловый спирт).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, от светло-коричневато-розового до оранжево-розового цвета, удлиненной формы, верхняя и нижняя поверхности которых выпуклые, с насечкой для деления.

Фармакотерапевтическая группа

Капилляростабилизирующие средства. Биофлавоноиды. Диосмин, комбинации. Код ATХ C05C A53.

Фармакодинамика

Лекарственное средство имеет венотоническое и ангиопротекторное действие, повышает венозный тонус, уменьшает растяжимость вен и веностаз, улучшает микроциркуляцию, уменьшает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, улучшает лимфатический дренаж, увеличивая лимфатический отток.

Препарат также уменьшает взаимодействие лейкоцитов и эндотелия, адгезию лейкоцитов в посткапиллярных венулах. Это снижает повреждающее действие медиаторов воспаления на стенки вен и створки клапанов вен.

Фармакокинетика

Период полувыведения составляет 11 часов.

Вывод действующего вещества происходит главным образом через кишечник. Через мочой выводится в среднем 14% дозы.

Показания

Симптоматическое лечение венолимфатичной недостаточности (тяжесть в ногах, боль, ночные судороги, отеки, трофические нарушения, включая варикозные язвы).

Симптоматическое лечение геморроя.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Особенности применения

Применение этого лекарственного средства при остром геморрое не заменяет специфического лечения и не препятствует лечению других проктологических заболеваний. Если в течение короткого курса лечения симптомы не исчезают быстро, следует провести проктологическое обследование и пересмотреть терапию.

При нарушениях венозного кровообращения более эффективному лечению способствует соблюдение следующих рекомендаций по образу жизни:

- избегать длительного пребывания на солнце, длительного пребывания на ногах, избыточной массы тела
- ходить пешком, в некоторых случаях носить специальные чулки для улучшения кровообращения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. В случае появления признаков побочного действия препарата (см. «Побочные эффекты») необходимо соблюдать осторожность.

Применение в период беременности или кормления грудью

На сегодня нет сообщений о каких-то побочных эффектов при применении диосмин и гесперидина беременным женщинам. Беременным женщинам препарат следует применять с осторожностью. Перед применением следует проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется кормление грудью во время применения препарата (в связи с отсутствием достаточного количества данных о проникновении препарата в грудное молоко).

Способ применения и дозы

Для перорального применения.

Назначать взрослым.

Лечение венолимфатической недостаточности (симптомы: отеки, боль, тяжесть в ногах,очные судороги, трофические язвы, лимфедема): 2 таблетки в сутки (в два приема) во время еды. После 1 недели применения можно принимать 2 таблетки в сутки однократно во время еды.

Хронический геморрой: 2 таблетки в сутки (в два приема) во время еды. После недели применения можно принимать 2 таблетки в сутки однократно во время еды.

Острый геморрой: 6 таблеток в сутки в течение первых 4 дней и по 4 таблетки в сутки в течение последующих 3 дней. Применять во время еды. Суточное количество таблеток разделить на 2-3 приема.

Курс лечения. Продолжительность лечения зависит от показаний к применению и течения заболевания. Средняя продолжительность лечения составляет 2-3 месяца.

Дети

Данные по применению препарата у детей отсутствуют, поэтому препарат не следует применять в педиатрической практике.

Передозировка

Не описано.

Побочные реакции

Сообщалось о нижеприведенные побочные реакции при применении лекарственного средства с действующим веществом флавоноидная фракция комбинации диосмин и гесперидина, которые по частоте распределены следующим образом: очень часто ($\geq 1/10$); часто ($\geq 1/100, < 1/10$); нечасто ($\geq 1/1000, < 1/100$) редко ($\geq 1/10000, < 1/1000$); очень редко ($< 1/10000$); частота неизвестна (невозможно определить по имеющейся информации).

Классификация по системам органов	Частота	Побочные реакции
Со стороны нервной системы	Редко	Головокружение головная боль недомогание
Со стороны желудочно-кишечного тракта	Часто	Диарея диспепсия тошнота рвота
	Нечасто	Колит
	Частота неизвестна	Боль в абдоминальной области

Со стороны кожи и подкожной клетчатки	Редко	Зуд высыпания крапивница
	Частота неизвестна	Изолированный отек лица, губ, век
Со стороны иммунной системы	частота неизвестна	В исключительных случаях - отек Квинке

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 6 блистеров в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., Г.. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника —
Государственного реестра лекарственных средств Украины.