

Состав

действующее вещество: гепарин натрия

100 г крема содержат гепарина натрия 30000 МЕ или 50000 МЕ

вспомогательные вещества: аллантоин, декспантенол, трилон Б, бронопол, хостафат

KW-340-N, лунацера М, карбомер 934, левоментол, масло минеральное легкое, глицерин моностеарат, изопропилмиристат, парафин белый мягкий, триэтаноламин, вода очищенная.

Лекарственная форма

Крем.

Основные физико-химические свойства: белого цвета гомогенный крем с характерным запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при варикозном расширении вен. Гепарин или гепариноиды для местного применения. Код АТХ C05B A03.

Фармакодинамика

Гепатромбин крем - препарат в высоких антикоагулянта прямого действия гепарина для наружного применения. Оказывает местное антитромботическое, противоотечное и противовоспалительное действие, стимулирует процессы обмена веществ в тканях, а также грануляцию и эпителизацию тканей, улучшает местный кровоток.

Фармакокинетика

При наружном применении гепарин не оказывает системного действия, быстро проникает через кожу и накапливается в роговом слое эпидермиса и, соответственно, имеет исключительно местное действие.

Показания

Лечение заболеваний поверхностных вен, таких как варикозное расширение вен, и связанных с ними осложнений; флеботромбоз, тромбофлебит, поверхностный

перифлебрит. Послеоперационный варикозно флебит, осложнения после хирургического удаления подкожных вен нижних конечностей. Травмы и ушибы, инфильтраты и локализованные отеки, подкожные гематомы. Травмы и растяжения мышечно-сухожильных и капсулозвязочных структур.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к гепарину или к любым другим компонентам препарата трофические язвы ног, кровоточащие; открытые и / или инфицированные раны, геморрагический диатез пурпура тромбоцитопения гемофилия. Склонность к кровотечениям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Гепатромбин нельзя применять вместе с лекарственными средствами для местного применения, например, с препаратами, содержащими тетрациклин, гидрокортизон, салициловую кислоту, антикоагулянты.

Применение гепарина может способствовать удлинению протромбинового времени у больных, принимающих пероральные антикоагулянты.

Особенности применения

Крем наносить только на неповрежденную кожу. Препарат не следует назначать при кровотечениях, наносить на инфицированные участки кожи при наличии гнойных процессов, слизистые оболочки. При наличии у больного геморрагических симптомов следует тщательно взвесить возможность применения препарата.

Крем нельзя наносить на мокнущие участки кожи, раны, язвы и волдыри, глаза и на участки вокруг глаз. В случае случайного попадания крема внутрь у ребенка может возникнуть тошнота или рвота. В таком случае необходимо сделать промывание желудка

ОСОБЫЕ

В случае расстройств свертывания крови крем не рекомендуется наносить на большие участки кожи.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Гепатромбин крем не влияет на способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью препарат можно применять лишь кратковременно при обоснованных показаний, если ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Применять местно.

Лечение начинать с применения дозы 50 000 МЕ / 100 г, тогда как дозу 30000 МЕ / 100 г применять для продолжения лечения.

На пораженное место и вокруг него наносить 1-3 раза в сутки слой крема толщиной около 1 мм и слегка втирать его в кожу.

При заболеваниях вен можно наложить венозный бандаж.

В случае лечения флебита это лекарственное средство не нужно втирать в кожу, а только наносить на пораженное место слоем толщиной около 1 мм и перевязать это место эластичной повязкой.

Продолжительность курса лечения устанавливает врач индивидуально в зависимости от течения болезни.

Дети

Вследствие ограниченного опыта применения препарат не следует назначать детям.

Передозировка

В связи с незначительной системной абсорбцией препарата опасность передозировки при местном применении отсутствует. В случае случайного применения внутрь возможны появление тошноты и рвоты. Необходимо сделать промывание желудка, дальнейшее лечение - симптоматическое.

Действие гепарина можно нейтрализовать с помощью протамина сульфата.

Побочные реакции

Обычно препарат переносится хорошо, только в редких случаях может возникнуть легкое раздражение кожи (покраснение), которое спустя некоторое время спонтанно исчезает.

В течение курса лечения может развиваться реакция повышенной чувствительности на некоторые ингредиенты препарата. К признакам такой повышенной чувствительности принадлежат зуд, покраснение, припухлость кожи, жжение, сыпь, крапивница, ангионевротический отек, геморрагии, иногда - возникновение небольших пустул, пузырьков или пузырей. При нанесении на большие участки кожи возможны системные побочные реакции.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 г в тубе; по 1 тубе в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

«Хемофарм» АД.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Белградский путь б / н, 26300, г.. Вршац, Сербия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).