

Состав

действующее вещество: троксерутин;

1 г геля содержит троксерутина 0,02 г (20 мг);

вспомогательные вещества: карбомер, динатрия эдетат, бензалкония хлорид, натрия гидроксид, вода очищенная.

Лекарственная форма

Гель.

Основные физико-химические свойства: гель желтого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Ангиопротекторы. Капилляростабилизирующие средства. Биофлавоноиды. Код АТХ C05C A04.

Фармакодинамика

Флеботон – капилляротонизирующее и венотонизирующее средство. Проявляет противовоспалительное и антиоксидантное действие, подавляет гиалуронидазу. Предотвращает окисление гиалуроновой, аскорбиновой кислоты и адреналина, подавляет перекисное окисление липидов. Троксерутин уменьшает проницаемость и ломкость капилляров и предотвращает повреждение базальной мембраны эндотелиальных клеток, и кроме этого, обладает еще мембраностабилизирующим, антигеморрагическим, детоксическим, антиаллергическим, венотонизирующим действием. Уменьшает отек, улучшает трофику и уменьшает другие симптомы, связанные с венозной недостаточностью или нарушением оттока лимфатической жидкости.

Фармакокинетика

Лекарственная форма препарата Флеботон (гель) обеспечивает полную абсорбцию активного вещества через роговой слой эпидермиса (stratum

corneum) и проникновение в кровеносные сосуды в подкожной ткани. Его pH соответствует величине pH кожи, в результате этого он не оказывает местного раздражающего и сенсibiliзирующего действия. Поскольку гель имеет водную основу, он не нарушает физиологические свойства кожи.

Показания

Симптоматическое лечение:

- предварикозный и варикозный синдром;
- поверхностный тромбофлебит, флебит и постфлебитные состояния;
- хроническая венозная недостаточность;
- отеки и боль при травмах и варикозных венах.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к троксерутину или к любому из вспомогательных веществ.
- Гель не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и экзематозные участки кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Усиливает капилляропротекторное действие аскорбиновой кислоты.

Особенности применения

Продолжительное применение может вызвать гиперчувствительность!

Бензалкония хлорид может вызвать кожные реакции.

Больным с выраженными нарушениями функции почек не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени.

Если при применении препарата выраженность симптомов заболевания не уменьшается, следует обратиться к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Клинических данных о применении препарата беременным и женщинам, кормящими грудью, нет. Поэтому применение допустимо только по назначению врача, который определит соотношение польза для женщины/риск для плода (ребенка).

Способ применения и дозы

Применять местно, наносить на кожу.

Гель наносить утром и вечером, осторожно втирая в пораженные участки кожи легкими массирующими движениями. Если необходимо, гель можно применять и под повязку, и под стягивающие чулки.

Дозировка и длительность лечения определяет врач индивидуально, учитывая тяжесть и течение заболевания.

В тяжелых случаях рекомендуется комбинированная терапия с применением троксерутина в капсулах.

Дети

Нет противопоказаний для применения препарата детям.

Передозировка

Нет данных о передозировке при местном применении препарата. При случайном приеме большого количества лекарственного средства внутрь необходимо применять общие меры для выведения препарата и проводить симптоматическое лечение при необходимости.

Побочные реакции

В редких случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, в том числе раздражение кожи, покраснение, зуд, кожные высыпания, дерматит, ангионевротический отек. Обычно симптомы исчезают после прекращения применения препарата.

Срок годности

5 лет.

Срок годности после вскрытия тубы – 1 месяц.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в оригинальной упаковке (в сухом, защищенном от света месте) при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 40 г геля в алюминиевой тубе с мембраной, с пластмассовым колпачком; по 1 тубе в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Софарма».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

ул. Илиенское шоссе, 16, София, 1220, Болгария.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).