

Состав

действующие вещества: диосмин, гесперидин;

1 таблетка содержит очищенной микронизированной флавоноидной фракции - 500 мг, которая содержит диосмин - 450 мг, гесперидина * - 50 мг;

* - под названием «гесперидин» подразумевают смесь флавоноидов: изоройфолину, гесперидина, линарина, диосметину;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая натрия крахмала (тип А); гипромеллоза; тальк натрия лаурилсульфат; магния стеарат смесь для покрытия «Opaglos 2 Orange» № 97A23967 содержит натрия карбоксиметилцеллюлозу, мальтодекстрин, глюкозы моногидрат, титана диоксид (Е 171), кислоту стеариновую очищенную, тальк, железа оксид желтый (Е172), железа оксид красный (Е172), желтый закат FCF (Е 110).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, бледно-розового цвета, овальной формы, с фаской, с насечкой с одной стороны таблетки и надписью «КМП» с другой стороны. На разломе видно ядро бежевого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Капилляростабилизирующие средства. Биофлавоноиды. Диосмин, комбинации. Код АТХ C05C A53.

Фармакодинамика

Диофлан имеет венотоническое и ангиопротекторное действие, повышает венозный тонус, уменьшает растяжимость вен и веностаз, улучшает микроциркуляцию, уменьшает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, улучшает лимфатический дренаж, увеличивая лимфатический отток. Препарат также уменьшает взаимодействие лейкоцитов и эндотелия, адгезию лейкоцитов в посткапиллярных венулах. Это снижает повреждающее действие медиаторов воспаления на стенки вен и створки клапанов вен.

Фармакокинетика

Период полувыведения составляет 11 часов. Выведение действующего вещества происходит главным образом через кишечник. Через мочой выводится в среднем 14% дозы.

Показания

Симптоматическое лечение венолимфатичной недостаточности (тяжесть в ногах, боль, отеки).

Симптоматическое лечение геморроя.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Исследования по взаимодействию не проводились. Данные о случаях взаимодействия отсутствуют.

Особенности применения

Применение этого лекарственного средства при остром геморрое не заменяет специфического лечения и не препятствует лечению других проктологических заболеваний. В случае, если в течение короткого курса лечения симптомы не исчезают быстро, следует провести проктологическое обследование и пересмотреть терапию.

При нарушениях венозного кровообращения эффективное лечение обеспечивается сочетанием терапии с соблюдением следующих рекомендаций по образу жизни:

- избегать длительного пребывания на солнце, длительного пребывания на ногах, избыточной массы тела;
- ходить пешком и в некоторых случаях носить специальные чулки для улучшения кровообращения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. В случае появления признаков побочного действия препарата (см. Раздел «Побочные реакции») необходимо соблюдать осторожность.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременным женщинам препарат следует применять с осторожностью. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Исследования не выявили тератогенного действия диосмин и гесперидина, и о побочных эффектах не сообщалось.

Из-за отсутствия данных относительно проникновения препарата в грудное молоко применения лекарственного средства в период кормления грудью следует избегать. Исследования репродуктивной токсичности показали отсутствие влияния диосмин и гесперидина на фертильность крыс.

Способ применения и дозы

Для перорального применения.

Назначать взрослым.

Лечение венолимфатической недостаточности (симптомы: отеки, боль, тяжесть в ногах, ночные судороги, трофические язвы, лимфедема).

Рекомендуемая доза составляет 2 таблетки в сутки 1 таблетка - днем и 1 таблетка - вечером, во время еды. После недели применения можно применять 2 таблетки в сутки однократно во время еды.

Лечение хронического геморроя. По 2 таблетки в сутки (в два приема) во время еды. После недели применения можно применять 2 таблетки в сутки однократно во время еды.

Лечение острого геморроя. По 6 таблеток в сутки в течение 4 дней, затем по 4 таблетки в сутки в течение последующих 3 дней. Применять во время еды. Суточное количество таблеток разделить на 2-3 приема.

Курс лечения. Продолжительность лечения зависит от показаний к применению и течения заболевания. Средняя продолжительность лечения составляет 2-3 месяца.

Дети

Данные по применению препарата у детей отсутствуют.

Передозировка

Про случаи передозировки не сообщалось.

Побочные реакции

Неврологические расстройства: головокружение, головная боль, недомогание.

Со стороны пищеварительной системы: диарея, диспепсия, тошнота, рвота, колит.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, крапивница, изолированный отек лица, губ, век, отек Квинке.

Наличие в составе препарата желтого мероприятия FCF (E 110) может вызывать аллергические реакции.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 6 блистеров в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ОАО «Киевмедпрепарат».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

01032, Украина, г. Киев, ул. Саксаганского, 139.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).