

Состав

действующие вещества: гепарин натрия, бензокаин;

1 г мази содержит гепарина натрия 100 ЕД, бензокаина 40 мг;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, масло подсолнечное, масло кукурузное, бензилникотинат, глицерин, эмульгатор Т-2, метилпарагидроксибензоат (Е 218), вода очищенная.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь от белого до белого с желтоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при варикозном расширении вен. Гепарин, комбинации.

Код АТХ С05В А53.

Фармакодинамика

Гепариновая мазь - антикоагулянт прямого действия, оказывает противовоспалительное и местное обезболивающее действия, предотвращает образование тромбов, способствует рассасыванию образовавшихся тромбов.

Фармакокинетика

Не определялась.

Показания

Профилактика и лечение тромбофлебита поверхностных вен, Постинъекционные и постинфузионные флебит, трофические язвы голени, слоновость, поверхностный перифлебит, лимфангит; наружный геморрой, воспаление геморроидальных узлов после родов; поверхностный мастит; локализованные инфильтраты и отеки, травмы и ушибы без нарушения целостности кожных покровов (в том числе мышечной ткани, сухожилий, суставов).

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата. Язвенно-некротические процессы, травматическое нарушение целостности кожных покровов, открытые инфицированные раны, геморрагический диатез, пурпура, тромбоцитопения, гемофилия, склонность к кровотечениям.

Особые меры безопасности

При тромбоцитопении и повышенной склонности к кровотечениям препарат применять под контролем врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Действие мази усиливают антикоагулянты, ацетилсалициловая кислота и другие нестероидные противовоспалительные средства. Эффективность мази ослабляют препараты наперстянки, тетрациклины, никотин, антигистаминные препараты. Применение гепарина может способствовать удлинению протромбинового времени у больных, принимающих пероральные антикоагулянты. Не следует применять препарат вместе с лекарственными средствами для местного применения, например с препаратами, содержащими тетрациклин, гидрокортизон, салициловую кислоту, с антикоагулянтами.

Особенности применения

При длительном применении мази на больших участках и одновременном и одновременном применении пероральных лекарственных средств, влияющих на свертывающую систему крови и / или кроветворения, следует контролировать время свертывания и протромбиновое время. При необходимости длительного курса лечения и на значительных участках поражения у женщин в возрасте от 65 лет рекомендуется аналогичный контроль.

Не следует наносить на открытые раны при наличии гнойных процессов. Применение мази не рекомендуется при глубоком венозном тромбозе.

Препарат не следует назначать при кровотечениях, наносить на слизистые оболочки, инфицированные участки кожи, в глаза и на участки вокруг глаз, на язвы и волдыри. В случае расстройств свертывания крови не рекомендуется наносить на большие участки кожи.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не использовать в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Препарат применять взрослым местно.

При тромбофлебите поверхностных вен конечностей мазь нанести на зону поражения тонким слоем (из расчета 0,5-1 г (2-4 см мази) на участок диаметром 3-5 см) и осторожно втирать в кожу 2-3 раза в сутки в течение 3-7 суток до исчезновения явлений воспаления. Возможность проведения длительного курса лечения определяет врач.

При тромбозе геморроидальных вен мазь нанести на салфетку из ткани, которую применять непосредственно на геморроидальные узлы и зафиксировать повязкой (возможно применение тампона с нанесенной на него мазью, который следует вводить в задний проход) 2-3 раза в сутки до исчезновения признаков воспаления, в среднем 3-14 суток. Возможность длительного применения определяет врач индивидуально.

Дети

Не применять.

Передозировка

За низкого уровня всасывания гепариновой мази ее передозировка невозможно.

Побочные реакции

Покраснение, сыпь на коже, крапивница, ангионевротический отек, геморрагии, иногда возможно возникновение небольших пустул, пузырьков или пузырей. Возможна местная раздражающее действие, которое проявляется в виде жжения, зуда или незначительного отека кожи. Наличие в составе препарата метилпарагидроксибензоат (Е 218) может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные), при нанесении на большие участки кожи возможны системные аллергические реакции, гиперемия.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 г в тубе; по 1 тубе в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП» Фармацевтическая фабрика ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).