Состав

действующие вещества: 100 г препарата содержат: Acidum benzoicum e resina D4 - 1 г, Aesculus hippocastanum D1 - 10 г, Apis mellifica D4 - 1 г, Arnica montana D3 - 1 г, Arteria suis D10 - 1 г, Baptisia tinctoria D4 - 1 г, Barium iodatum D6 - 1 г, Colchicum autumnale D4 - 1 г, Cuprum metallicum D13 - 1 г, Echinacea D2 - 1 г, Eupatorium cannabinum D3 - 1 г, Hamamelis virginiana D4 - 1 г, Natrium pyruvicum D8 - 1 г, Nicotiana tabacum D10 - 1 г, Rhus toxicodendron D4 - 1 г, Ruta graveolens D4 - 1 г, Secale cornutum D3 - 1 г, Solanum dulcamara D4 - 1 г, Solanum nigrum D6 - 1 г, Viscum album D2 - 1 г;

вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Препарат содержит 35% об. этанола 96%.

1 мл препарата содержит 21 каплю.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: от прозрачного до опалесцирующая светло-желтого цвета раствор с запахом этанола.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат нормализует состояние венозного кровообращения и микроциркуляцию. Действие препарата основано на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.

Показания

В комплексном лечении нарушений периферического кровообращения: диабетическая ангиопатия сосудов нижних конечностей II-III степени, варикозное расширение вен, в том числе геморроидальных узлов, облитерирующий эндартериит нижних конечностей и их гангренозный состояние, постинсультные и постинфарктного состояния, пролежни,

дисциркуляторная энцефалопатия.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к растениям семейства сложноцветных (в т.ч. *Arnica*, *Echinacea*), семьи плюща ядовитого, омелы белой или другим компонентам препарата.

Туберкулез, лейкоз, онкологические заболевания, воспалительные заболевания соединительных тканей (коллагеновые болезни, в т.ч. ревматизм, системная красная волчанка), аутоиммунные заболевания, рассеянный склероз, заболевания системы крови, СПИД, ВИЧ инфекция, иммуносупрессия или иммунодефицит различной этиологии и другие хронические вирусные заболевания.

Хронические гранулематозные заболевания и аутоиммунопатии, гипертиреоз с несбалансированным метаболическим нарушениям. Острые воспалительные и лихорадочные состояния.

Не следует применять при нарушениях функции щитовидной железы без консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Вследствие иммуностимулирующего действия эхинацея может уменьшать эффективность препаратов, оказывающих иммунодепрессивное действие.

Особенности применения

Если симптомы не исчезают или состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Случаи воздействия неизвестны.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не применяют.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым - по 10 капель 3 раза в день за 15-20 минут до еды или через 1 час после еды. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту (можно не растворять, а сразу капать под язык). При приступе боли в нижних конечностях, который сопровождается хромотой, разовую дозу рекомендуется принимать каждые 15 минут до улучшения состояния, но не более 2 часов. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.

Курс лечения - 4-6 недель. При необходимости через 2-3 недели курс лечения повторить (после консультации с врачом).

Дети

Препарат не применять детям.

Передозировка

Возможно усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

В редких случаях могут возникать побочные реакции со стороны пищеварительного тракта или кожные реакции, в том числе через несколько дней после применения.

В очень редких случаях у лиц с гиперчувствительностью к растениям семейства сложноцветных (например, *Arnica*, *Echinacea*) или другим компонентам препарата могут наблюдаться аллергические реакции.

После применения препаратов, содержащих экстракты *Echinacea*, наблюдались побочные реакции со стороны пищеварительного тракта (тошнота, боль в животе); менструальные расстройства; акне, сыпь, покраснение, зуд, крапивница; возбуждение, нарушение сна, редко - отек лица, затрудненное дыхание (одышка), головокружение и снижение артериального давления.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 мл в стеклянном флаконе-капельнице в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).