

Состав

действующее вещество: кислота аминкапроновая;

1 мл раствора содержит кислоты аминкапроновой 50 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор.

Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Антигеморрагические средства. Ингибиторы фибринолиза. Аминокислоты. Код АТХ В02А А01.

Фармакодинамика

Аминкапроновая кислота оказывает противоаллергическое, противовирусное действие, усиливает детоксикационную функцию печени. Она ингибирует протеолитическую активность, ассоциированную с вирусом гриппа.

Аминкапроновая кислота осуществляет тормозящее влияние на ранние этапы взаимодействия вируса с чувствительными клетками, а также подавляет протеолитическую активность гемагглютинаина. Вследствие этого создается функционально активный белок вируса гриппа, обеспечивающий его инфекционную активность, и снижается количество дочернего инфекционного вируса. Аминкапроновая кислота не только проявляет противовирусную активность, но также влияет на некоторые клеточные и гуморальные показатели специфической и неспецифической защиты организма при респираторных вирусных инфекциях.

Фармакокинетика

При местном введении фармакокинетика не исследована.

Показания

Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей и взрослых.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Склонность к тромбозам и тромбоэмболических заболеваний; коагулопатия вследствие диффузного внутрисосудистого свертывания крови заболевания почек с нарушением их функции; тромбоэмболия, почечная недостаточность, гематурия, роды; беременность или период кормления грудью тяжелая форма ишемической болезни сердца, нарушения мозгового кровообращения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Эффект препарата ослабляют антикоагулянты и антиагреганты прямого и непрямого действия.

Совместное применение с эстрогенсодержащими контрацептивами, фактором свертывания крови IX повышает риск тромбоэмболии.

Применяют с осторожностью пациентам, принимающим ретиноиды (в т.ч. третиноин).

Особенности применения

Применяют с осторожностью пациентам с заболеваниями сердца. Если есть необходимость применения лекарственного средства пациентам с сердечными заболеваниями, рекомендуется проводить мониторинг уровня КФК в плазме крови.

При гематурии назначение препарата противопоказано из-за угрозы возникновения острой почечной недостаточности (см. Раздел «Противопоказания»). Рекомендуется исключить жирную пищу при лечении препаратом.

Неиспользованные остатки препарата следует утилизировать.

Это лекарственное средство содержит 3,85 ммоль (или 88,5 мг)/дозу 25 мл натрия. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, применяют натрий-контролируемую диету.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

В период лечения следует воздержаться от управления автотранспортом и выполнения потенциально опасных видов деятельности в связи с возможными побочными реакциями со стороны центральной нервной системы.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат противопоказан в период беременности или кормления грудью.

В случае необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.

Способ применения и дозы

С целью профилактики и лечения гриппа и ОРВИ препарат применять местно (0,5-1,0 мл в нос 3-4 раза в сутки) и перорально.

При местном применении рекомендуется каждые 3-4 часа закладывать в носовые ходы на

5-10 минут ватные турунды, увлажненные 5% раствором аминокaproновой кислоты, или в указанные сроки инстилюваты (закапывать) по 3-5 капель раствора в каждый носовой ход.

Аминокaproновой кислоты при необходимости можно применять в комбинации с другими противовирусными препаратами и интерфероном и его индукторами.

Интраназальные инстилляций аминокaproновой кислоты (3-4 раза в сутки) целесообразно проводить в период эпидемии гриппа с целью профилактики, что целесообразно дополнить энтеральным (как при лечении) применением препарата в очагах инфекции при контакте с больным.

Для перорального применения рекомендуется использовать аминокaproновой кислоты в бутылках по 100 мл.

Перорально детям препарат назначать в дозах:

- детям в возрасте до двух лет - 1-2 г (20-40 мл 5% раствора в сутки) - по 1-2 чайные ложки 4 раза в сутки (0,02-0,04 г/кг - разовая доза), можно добавлять к пище или напитков;
- детям в возрасте от 2 до 6 лет - 2-4 г (40-80 мл 5% раствора в сутки) - 2-4 чайные ложки или 1 столовая ложка 4 раза в сутки или разделив суточную дозу на 4 приема;
- детям в возрасте от 7 лет и взрослым - 4-5 г (80-100 мл 5% раствора в сутки), разделив суточную дозу на 4 приема. По 20 или 25 мл за один прием, то есть

4 или 5 контейнеров.

Для более точного дозирования раствора целесообразно использовать медицинский шприц без иглы объемом 10 или 20 мл.

Продолжительность приема внутрь аминокaproновой кислоты при гриппе и ОРВИ составляет 3-7 дней.

Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и определяется врачом индивидуально. Также врач может корректировать дозу и назначить повторный курс лечения.

Дети

Данных об ограничении применения препарата у детей нет.

Передозировка

Внезапное снижение фибринолитической активности крови. Выраженные симптомы побочного действия: головокружение, тошнота, диарея, кожная сыпь, ортостатическая гипотензия, судороги, головная боль, заложенность носа, острая почечная недостаточность, рабдомиолиз, миоглобинурия. Усиление побочных реакций, образования тромбов эмболии. При длительном применении (более 6 дней) высоких доз (для взрослых - более 24 г в сутки) - геморрагии.

Лечение. В случае передозировки введение лекарственного средства прекратить и проводить соответствующую симптоматическую терапию.

Побочные реакции

Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатическая гипотензия, брадикардия, аритмии.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея.

Со стороны свертывающей системы крови: нарушение свертываемости крови, при длительном применении (более 6 суток) высоких доз (для взрослых - более 24 г в сутки) - геморрагии.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, шум в ушах, судороги.

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая аллергические реакции, сыпь, заложенность носа, катаральные явления верхних

дыхательных путей.

Со стороны мочевыделительной системы: миоглобинурия, острая почечная недостаточность.

Другие: рабдомиолиз.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 2 мл в контейнере; по 10 контейнеров в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Юрия-Фарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 18030, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Кобзарская, 108.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).