

Состав

5 мл сиропа содержит:

- чабреца травы экстракт этаноловых глицериново водный (*Thymus vulgaris*, 1:4) - 0,24 г;
- первоцвета весеннего корней экстракт этанолово-глицериново-водный (*Primula veris*, 1:3) - 0,13 г;
- травы эхинацеи пурпурной экстракт сухой (*Echinacea purpurea*, 6-8:1), ст. 4% полифенолов - 0,04 г;

вспомогательные вещества: сахароза, глицерин, мед, эфирное масло аниса, эфирное масло сосны, вода очищенная, бензоат натрия.

Сироп содержит 2% спирта.

Лекарственная форма

Сироп. Травяная формула для облегчения отхаркивания.

Фармакологические свойства

Содержит экстракты первоцвета, чабреца, эхинацеи; мед, эфирные масла аниса и сосны. Экстракты чабреца и первоцвета традиционно используются для облегчения кашля. Эфирные масла и флавоноиды травы чабреца оказывают бронхолитическое, секретолитическое, антисептическое и антибактериальное действие, таким образом способствуют быстрому растворению мокроты, что накопилась в дыхательных путях, уменьшают кашель, облегчают дыхание, а также влияют на возбудителей инфекции. Сапонины из экстракта корня первоцвета способствуют усилению бронхолегочной секреции, разрежению мокроты, облегчают его эвакуацию. Активные компоненты сиропа способствуют образованию защитной пленки на слизистой дыхательных путей, снижая раздражение кашлевых рецепторов, что подавляет кашлевой рефлекс. Экстракт эхинацеи и мед укрепляют защиту организма.

Показания

Бронхочист сироп разработан для поддержки нормальной функции слизистой оболочки дыхательных путей, облегчает состояния, связанные с раздражением дыхательных путей при кашле.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, сахарный диабет, для детей младше 12 лет. С осторожностью применять в период беременности и кормления грудью. С особой осторожностью применять пациентам с гастритом и язвенной болезнью.

Особенности применения

Рекомендуемая суточная доза не должна быть превышена. Сироп содержит активные ингредиенты растительного происхождения, поэтому его цвет в процессе хранения может изменяться. Однако, поскольку растительные экстракты стандартизованные, эффект препарата остается неизменным.

Применение в период беременности или кормления грудью

Сироп во время беременности и в период лактации применяют только с осторожностью и если это рекомендовано врачом.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12-ти лет принимать 5 мл сиропа (одна мерная ложка) 3-5 раз в день.

Перед приемом необходимо встряхнуть флакон.

Рекомендуемая продолжительность использования - одна неделя.

Дети

Детям с 12 лет.

Побочные реакции

Желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота и боль в животе) и аллергические реакции. Чрезмерное использование препаратов на основе корня первоцвета может вызвать расстройства желудка, рвоту и диарею.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в защищенном от света и влаги месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 200 мл сиропа во флаконе с мерной ложкой в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ФАРМАНОВА Д.О.О, Сербия.