

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит масла мяты перечной в пересчете на 50% ментол - 2,5 мг

вспомогательные вещества: сахар кондитерский, тальк, кальция стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, с риской и фаской, плоскоцилиндрической формы.

Фармакотерапевтическая группа

Противорвотные средства и препараты, устраняющие тошноту. Код АТХ А04А D.

Фармакодинамика

Мятные таблетки, стимулируя чувствительные рецепторы слизистых оболочек ротовой полости и желудка, рефлекторным путем ослабляют ощущение тошноты и предупреждают рвоту, а также оказывают умеренное спазмолитическое, успокаивающее и желчегонное действие.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Симптоматическое лечение тошноты, рвоты, спазмов гладких мышц желудочно-кишечного тракта, ощущение горечи во рту.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Сахарный диабет, круп, спазмофилия, бронхиальная астма. Возраст до 3 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не выявлено.

Особенности применения

Пациентам с желудочно-пищеводного рефлюкса (изжогой) следует избегать применения препарата, поскольку может увеличиться изжога.

Если у вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат в целом не влияет на способность управлять автомобилем и заниматься другими видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. В случае появления признаков побочного действия препарата (см. «Побочные реакции») необходимо избегать управления автотранспортом или работы с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата в период беременности возможно только тогда, когда ожидаемая польза от лечения матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. При необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Способ применения и дозы

Назначать по 1-2 таблетки под язык. Максимальная доза для взрослых и детей старше 12 лет - 8-10 таблеток в сутки. Для детей от 3 до 12 лет - 3-5 таблеток в сутки.

Курс лечения зависит от достигнутого эффекта лечения.

Дети

Не применять детям до 3 лет.

Передозировка

Нерациональное применение препаратов мяты может привести к боли в области сердца.

Побочные реакции

Боль в области сердца; аллергические реакции, в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, дерматит в отдельных случаях - головокружение. При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата.

Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистерах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).