

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 таблетка содержит масла мяты перечной в пересчете на 50% ментол - 2,5 мг

*вспомогательные вещества:* сахар кондитерский, тальк, кальция стеарат.

## **Лекарственная форма**

Таблетки.

*Основные физико-химические свойства:* таблетки белого цвета, с риской и фаской, плоскоцилиндрической формы.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Противорвотные средства и препараты, устраняющие тошноту. Код АТХ А04А D.

## **Фармакодинамика**

Мятные таблетки, стимулируя чувствительные рецепторы слизистых оболочек ротовой полости и желудка, рефлекторным путем ослабляют ощущение тошноты и предупреждают рвоту, а также оказывают умеренное спазмолитическое, успокаивающее и желчегонное действие.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

Симптоматическое лечение тошноты, рвоты, спазмов гладких мышц желудочно-кишечного тракта, ощущение горечи во рту.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Сахарный диабет, круп, спазмофилия, бронхиальная астма. Возраст до 3 лет.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не выявлено.

### **Особенности применения**

Пациентам с желудочно-пищеводного рефлюкса (изжогой) следует избегать применения препарата, поскольку может увеличиться изжога.

Если у вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат в целом не влияет на способность управлять автомобилем и заниматься другими видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. В случае появления признаков побочного действия препарата (см. «Побочные реакции») необходимо избегать управления автотранспортом или работы с механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применение препарата в период беременности возможно только тогда, когда ожидаемая польза от лечения матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. При необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

### **Способ применения и дозы**

Назначать по 1-2 таблетки под язык. Максимальная доза для взрослых и детей старше 12 лет - 8-10 таблеток в сутки. Для детей от 3 до 12 лет - 3-5 таблеток в сутки.

Курс лечения зависит от достигнутого эффекта лечения.

### **Дети**

Не применять детям до 3 лет.

### **Передозировка**

Нерациональное применение препаратов мяты может привести к боли в области сердца.

## **Побочные реакции**

Боль в области сердца; аллергические реакции, в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, дерматит в отдельных случаях - головокружение. При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата.

*Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.*

## **Срок годности**

2 года.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 10 таблеток в блистерах.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ЧАО «ФИТОФАРМ».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).