

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 г мази содержит: 166,70 мг стандартизированной суспензии культуры бактерий (содержит  $3,3 \times 10^8$  E.coli, убитых и законсервированных в 3,3 мг сжиженного фенола);

*вспомогательные вещества:* ланолин, парафин желтый мягкий.

## **Лекарственная форма**

Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* однородная мазь, от белого до бежевого цвета, с характерным запахом фенола.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.

Код АТХ С05А Х.

## **Фармакодинамика**

Препарат стимулирует процессы местного иммунитета за счет антигенного действия, вызывая как неспецифическую, так и специфическую иммунные реакции, в результате чего повышается местное иммунное сопротивление. Ускоряет и улучшает заживление ран, обладает противовоспалительным эффектом, предупреждает реинфекции и суперинфекции.

## **Фармакокинетика**

Вследствие сорбции или трансцитоза компоненты суспензии культуры бактерий действуют как антигены и инициируют процесс местной иммунизации, что, в свою очередь, вызывает защитную иммунную реакцию.

## **Показания**

Местное лечение симптомов геморроя, экземы и трещин анальной области.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому компоненту препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна.

## **Особенности применения**

В случае грибковых инфекций необходимо одновременно применять местный противогрибковый препарат.

Во время лечения мазью Постеризан прочность презервативов на разрыв может снизиться из-за содержания компонента желтого мягкого парафина, и, таким образом это может негативно повлиять на качество презерватива.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Данные отсутствуют.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Для применения препарата в период беременности и кормления грудью противопоказаний нет.

## **Способ применения и дозы**

Перед применением необходимо провести гигиенические процедуры анальной области.

Взрослым наносить мазь на пораженный участок кожи и слизистые оболочки 2 раза в сутки (утром и вечером), по возможности после дефекации, осторожно втереть пальцем.

Для ввода мази в анальный канал и прямую кишку можно использовать аппликатор с боковыми отверстиями, который находится в упаковке.

Продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно срок применения составляет 5-7 дней.

## **Дети**

Не применять детям.

## **Передозировка**

О случаях передозировки или интоксикации не сообщалось. В случае случайного приема внутрь мази (например, детьми) возможны желудочно-кишечного тракта (боли в животе, тошнота).

### **Побочные реакции**

В отдельных случаях у больных с повышенной чувствительностью к компонентам мази Постеризан могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, включая зуд и жжение.

Может вызвать контактный дерматит (например, через гиперчувствительность к фенолу).

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей и защищенном от света месте.

### **Упаковка**

По 25 г в тубе алюминиевой с аппликатором.

По 1 тубе в картонной пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Др. Каде Фармацевтическая фабрика ГмбХ.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Ригиштрассе, 2, 12277 Берлин, Германия.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).