

Состав

действующие вещества: 10 мл препарата содержат: экстракт из смеси листьев, цветов и плодов боярышника (*Crataegi folii cum flore, fructus extractum*) (1: 1,6-2,2), экстрагент: этанол 50% (об / об) - 7,125 мл экстракт травы пустырника (*Leonuri herbae extractum*) (1: 1,7-2,2), экстрагент: этанол 40% (об / об) - 1,0 мл экстракт листьев мелиссы (*Melissae herbae extractum*) (1: 1,6-2,1), экстрагент: этанол 60% (об / об) - 1,0 мл экстракт корня валерианы (*Valerianae radix extractum*) (1: 1,6-2,1), экстрагент: этанол 60% (об / об) - 0,5 мл

вспомогательные вещества: сахароза, вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли оральные, раствор.

Основные физико-химические свойства. Жидкость коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Психолептическое средства. Снотворные и седативные препараты. Другие снотворные и седативные средства. Код АТХ N05СМ.

Фармакологические свойства

Действие лекарственного средства обусловлено синергическим сочетанием лечебных эффектов лекарственных растений, входящих в его состав: пустырника, мелиссы, боярышника и валерианы.

При неврозах, в том числе кардионеврозе, других функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы, которые могут сопровождаться болями, ощущением сердцебиения, потливостью, приливами жара, ощущением перебоев в работе сердца, компоненты препарата устраняют болезненные проявления и нормализуют работу сердца и сосудов. Боярышник дополнительно улучшает насосную функцию сердца, улучшает кровообращение в сердце и мозге, одновременно уменьшая возбудимость.

В стрессовых ситуациях благодаря защитным седативным и вегетостабилизирующим эффектам препарата устраняется нервное напряжение, раздражительность и беспокойство. Улучшается общее состояние, самочувствие и работоспособность.

При бессоннице препарат не имеет прямого снотворного эффекта, однако облегчает наступление физиологического сна, углубляет его и улучшает качество.

Препарат не вызывает привыкание или зависимость.

Показания

Применяют для поддержания сердечно-сосудистой системы при нервном напряжении (стрессе), нейроциркуляторной дистонии, неврозах сердца, в комплексном лечении артериальной гипертензии I-II степени, стенокардии I-II степени, аритмии при стрессовых ситуациях и для улучшения самочувствия при нервном возбуждении у взрослых.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Депрессия и другие расстройства, сопровождающиеся угнетением центральной нервной системы. Выраженная артериальная гипотензия и брадикардия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно возможности применения препарата.

Препараты валерианы могут усиливать действие алкоголя, седативных, снотворных, анальгетических, спазмолитических и анксиолитическим препаратов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами до сих пор не исследовалась.

Особенности применения

Если симптомы не исчезают и / или появились отеки ног, или возникли симптомы неясного генеза, необходимо обратиться к врачу. При болях в области сердца, которые могут распространяться на руки, эпигастральную область или область шеи, или при появлении одышки следует немедленно обратиться к врачу.

Лекарственное средство Карвелис содержит сахарозу. При непереносимости определенных видов сахаров до начала приема препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

В период применения лекарственного средства следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

При применении препарата следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.

Пациентам, которые должны тяжелое нарушение функции печени или перенесли тяжелое заболевание печени в прошлом, следует соблюдать осторожность при приеме препарата.

Может иметь место специфическая чувствительность к запаху валерианы.

Применение в период беременности или кормления грудью

Перед началом приема препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение препарата Карвелис беременным женщинам недостаточно исследовано. Беременным женщинам и кормящим грудью, не рекомендуется принимать препарат.

Способ применения и дозы

Взрослым следует принимать по 30 капель (1,2 мл) препарата Карвелис 3 раза в сутки, предварительно растворив капли в небольшом количестве жидкости.

Если симптомы заболевания не исчезают в течение 2 недель, усиливаются или появились побочные реакции, не указанные в этой инструкции, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Дети

Безопасность и эффективность применения препарата у детей (в возрасте до 18 лет) не установлены, поэтому Карвелис не применяется пациентам этой возрастной группы.

Передозировка

Однократное принятие дозы в 2-3 раза превышает рекомендованную дозу, как правило, не вызывает отрицательных последствий. При этом следует продолжать применение препарата в соответствии с инструкцией. При значительном превышении рекомендуемой дозы возрастает вероятность возникновения побочных реакций.

Симптомы: головная боль, сонливость, вялость, боль в животе, тошнота, снижение остроты слуха и зрения, тахикардия.

Лечение: прекратить применение препарата, промыть желудок, принять активированный уголь.

Побочные реакции

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, изжога, спастические боли в животе.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение артериального давления, замедление сердечного ритма.

Аллергические реакции кожи: покраснение, сыпь, зуд, отек кожи.

Со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, сонливость, угнетение эмоциональных реакций, депрессия, общая слабость, снижение умственной и физической работоспособности

Частота возникновения побочных действий неизвестна.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

36 месяцев. После вскрытия флакона срок годности составляет 6 месяцев.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С в защищенном от света месте, в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл во флаконе, по 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/ Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия / Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).