

## **Состав**

*действующие вещества:* 10 г гранул содержат Ignatia 30CH 20 мг, Ignatia 1000CH 20 мг, Veratrum album 30CH 20 мг, Gelsemium 30CH 20 мг, Gelsemium 200CH 20 мг;

*вспомогательное вещество:* крупка сахарная.

## **Лекарственная форма**

Гранулы.

*Основные физико-химические свойства:* гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Свойства препарата обусловлены сочетанием входящих в его состав растительных компонентов.

Оказывает анксиолитическое и вегетостабилизирующее действие при отсутствии седативного эффекта. Уменьшает беспокойство, чувство тревоги, страха, напряжения.

Оказывает умеренное антидепрессивное и противосудорожное действие.

Не вызывает дневную сонливость.

## **Показания**

В комплексном лечении: тревожные состояния; невротические состояния, сопровождающиеся чувством тревоги, опасности, беспокойства, напряжения, ухудшением сна, раздражительностью; тревожно-депрессивные состояния и невротические депрессии на фоне соматических заболеваний; органические поражения центральной нервной системы с повышенной возбудимостью, судорожной готовностью.

## **Противопоказания**

Индивидуальная гиперчувствительность к компонентам препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При одновременном применении с другими лекарственными средствами интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

### **Особенности применения**

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества – крупки сахарного – проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство, если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не содержит седативных компонентов и не приводит к дневной сонливости, поэтому не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям в возрасте от 3 лет назначать по 5 гранул под язык 1-3 раза в сутки курсами по 3-4 недели с перерывом 7 дней.

Гранулы следует применять под язык до полного рассасывания, за 15-20 минут до или через 1 час после еды. При необходимости гранулы можно предварительно растворить в небольшом количестве воды.

Детям от 1 до 3 лет с повышенной судорожной готовностью препарат назначать по 3 гранулы, предварительно растворенные в небольшом количестве воды, 1 раз в сутки.

### **Дети**

Препарат не назначают детям в возрасте до 1 года.

## **Передозировка**

Не приводит к негативным последствиям и не требует антидотной терапии.

## **Побочные реакции**

В редких случаях возможно возникновение аллергических реакций. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 10 г в пенале/флаконе; по 1 пеналу/флакону в пачке из картона.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).