

## **Склад**

*діючі речовини:* настойка беладони листя, настойка конвалії трави, настойка валеріани кореневищ з коренями, ментол рацемічний;

1 мл препарату містить настойки беладони листя (*Belladonnae folia*) (1:10) (екстрагент - етанол 40 %) 0,2 мл; настойки конвалії трави (*Convallariae herba*) (1:10) (екстрагент - етанол 70 %) 0,4 мл; настойки валеріани кореневищ з коренями (*Valerianae rhizoma cum radicibus*) (1:5) (екстрагент - етанол 70 %) 0,4 мл; ментолу рацемічного 8 мг.

## **Лікарська форма**

Краплі оральні.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина зеленуватого або жовто-бурого кольору з характерним запахом.

## **Фармакотерапевтична група**

Комбіновані кардіологічні препарати. Код АТХ С01Е Х.

## **Фармакологічні властивості**

*Фармакодинаміка.*

Препарат чинить седативну, спазмолітичну, кардіотонічну, аналгетичну дію, зумовлені біологічно активними речовинами, які входять до складу препарату. Завдяки вмісту настойки беладони прискорює серцевий ритм.

*Фармакокінетика.*

Не визначалась.

## **Показання**

Вегетативні неврози, брадикардія.

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до компонентів препарату. Органічні ураження серця і судин, глаукома, гіпертрофія передміхурової залози.

## **Особливі заходи безпеки**

Пацієнтам літнього віку та дітям віком від 12 років препарат застосовувати з обережністю через вміст беладони настойки (алкалоїд групи атропіну).

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами**

Препарат посилює вплив седативних, снодійних засобів, нейролептиків, транквілізаторів на центральну нервову систему, кардіотоніків, анальгезуючих засобів. Зменшує дію антиаритмічних засобів, які призначають при тахікардії.

## **Особливості щодо застосування**

### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Протипоказано.

### ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

У період лікування препаратом слід утримуватися від керування автотранспортом та роботи з іншими механізмами.

## **Спосіб застосування та дози**

Внутрішньо дорослим застосовувати по 20-25 крапель 2-3 рази на добу, розводячи невеликою кількістю води. Дітям віком від 12 років – з розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 2-3 рази на добу. Тривалість курсу лікування визначає лікар.

## **Діти**

Не застосовувати дітям віком до 12 років.

## **Передозування**

Може з'явитися серцебиття, сухість у роті, порушення акомодатції, розширення зіниць, головний біль, запаморочення, загальна слабкість, нудота, тахікардія. При виявленні ознак передозування необхідно припинити застосування препарату і звернутися до лікаря з метою проведення симптоматичної терапії.

## **Побічні ефекти**

*Неврологічні розлади:* психомоторне збудження, сонливість, депресія, зниження розумової та фізичної працездатності, пригнічення емоцій, головний біль, запаморочення, розлади зору.

*Кардіальні порушення:* тахікардія.

*З боку шлунково-кишкового тракту:* сухість у роті, спрага, нудота, блювання, діарея, запор.

*З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини:* м'язова слабкість.

*Алергічні реакції,* включаючи почервоніння шкіри, висипання, свербіж, набряки.

*Загальні порушення:* підвищення температури тіла.

### **Термін придатності**

3 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 25 мл у флаконі.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».