

Состав

действующее вещество: настойки равных соотношений травы пиона уклончивого, корневищ и корней пиона уклончивого(1:10) (*Paoniae anomalae herba - Paoniae anomalae rhizomata et radices 1: 1*), (экстрагент - этанол 40%) - 50 мл;

вспомогательные вещества: кроме экстрагента, отсутствуют.

Лекарственная форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: жидкость светло-коричневого цвета, горького вяжущего вкуса, своеобразного запаха. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Снотворные и седативные средства. Код АТХ N05C M.

Фармакодинамика

Трава, корневища та корені півонії ухильної містять феноли, дубильні речовини, органічні кислоти. Півонії настойка має спазмолітичні, протисудомні властивості і здатність підвищувати кислотність шлунка та опір організму до гіпоксії.

Фармакокінетика

Не определялась.

Показания

Функциональные нарушения центральной нервной системы (нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, невротические состояния).

Противопоказания

Артериальная гипотензия. Индивидуальная повышенная чувствительность к биологически активным веществам, которые содержатся в лекарственном растительном сырье.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат может усиливать действие седативных и снотворных средств, транквилизаторов, нейролептиков, антидепрессантов с седативным действием, а также усиливает действие алкоголя.

Особенности применения

При длительном приеме больших доз препарата необходимо контролировать желудочную кислотность у пациентов с тенденцией к ее повышению.

Перед применением взбалтывать.

Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени из-за содержания этанола.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

В период лечения «Пионы настойкой» пациенту следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения другой работы, требующей повышенного внимания, скорости психических и двигательных реакций.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано применение во время беременности (действует abortивно) или в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

«Пиона настойку» принимать внутрь за 10-15 мин до еды, предварительно растворив в небольшом количестве воды. Взрослым назначать по 15-20 капель настойки 2-3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально для каждого пациента с учетом характера, степени тяжести и особенностей течения заболевания, стабильности достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.

Рекомендуемая продолжительность лечения - 2 недели, при необходимости курс лечения можно повторить после перерыва (через 2-3 месяца).

Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства наблюдаются любые

побочные реакции.

Дети

Не рекомендуется применять препарат в педиатрической практике из-за отсутствия опыта применения.

Передозировка

При превышении рекомендуемых доз наблюдается снижение артериального давления, головокружение, сонливость.

В случае передозировки следует прекратить применение препарата и принять меры симптоматической и поддерживающей терапии (в соответствии с клиническим состоянием больного).

Побочные реакции

Со стороны нервной системы: сонливость, общая слабость.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия.

Местные аллергические реакции: гиперемия и высыпания на коже, зуд, отек.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл в стеклянных флаконах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).