

Состав

действующее вещество: алтея корни.

Лекарственная форма

Корни.

Основные физико-химические свойства: кусочки корней различной формы. Цвет белый, желтовато-белый, от серовато-белого до серовато-коричневого, серый.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A05.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества лекарственного средства поступают противовоспалительное, смягчающее, отхаркивающее, обволакивающее действие, ускоряют регенерацию тканей, уменьшают воспалительный процесс.

Показания

Заболевания дыхательных путей (хронические бронхиты, трахеиты, ларингиты, пневмонии, бронхиальная астма, коклюш).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к биологически активным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Замедляет всасывание других препаратов, применяемых одновременно. При совместном применении с противовоспалительными средствами препарат пролонгирует их действие, повышает эффективность и снижает побочное действие. Как отхаркивающее средство можно сочетать с натрия бикарбонатом. При совместном применении с противокашлевыми препаратами возможно скопление мокроты в дыхательных путях, поэтому не рекомендуется применять одновременно с противокашлевыми средствами (например кодеином) при совместном применении с антибиотиками повышает концентрацию антибиотиков в дыхательных путях.

Особенности применения

При применении препарата следует придерживаться рекомендаций врача. Не рекомендуется назначение при сухом кашле, так как возможно его усиление. Если во время лечения развивается одышка, повышение температуры или появляется гнойная мокрота, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Прием препарата не рекомендуется в связи с отсутствием опыта его применения в период беременности или кормления грудью. При необходимости применения кормление грудью следует прекратить.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку корней поместить в эмалированную посуду, залить 100 мл кипяченой воды комнатной температуры и настаивать 1 час на водяной бане, процедить. Принимать в теплом виде взрослым и детям старше 12 лет - по 1 столовой ложке 4-6 раз в день, детям 3-7 лет - по 1 десертной ложке 4-6 раз в день, 7-12 лет - по 1 столовой ложке 4 раза в день. Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Применять детям в возрасте от 3 лет.

Передозировка

Тошнота, рвота. *Лечение:* отмена препарата, промывание желудка.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т. ч. кожные высыпания, зуд). Усиленное слюноотделение, раздражение слизистой оболочки желудка.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

Упаковка

По 75 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.