

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит *Cypripedium pubescens D4* 15 мг, *Magnesium carbonicum D10* 20 мг, *Zincum valerianicum D12* 15 мг;

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, тальк, лактоза, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: белого или почти белого цвета двухплоскостные таблетки со скошенной кромкой.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Активные компоненты препарата эффективны при таких симптомах как нервозность, раздражительность, чувство тревоги.

Показания

Состояния беспокойства, возбуждения и бессонницы у детей до 6 лет.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

Особенности применения

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

При отсутствии улучшения после 2-3 недель лечения или при частом повторении симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат предназначен для применения у детей.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат предназначен для применения у детей.

Способ применения и дозы

Детям от рождения до 6 лет: по 1 таблетке 4 раза в сутки.

Курс лечения 2-4 недели.

Таблетки следует принимать за 30 минут до или через 30 минут после еды, медленно рассасывая их во рту. При лечении младенцев таблетки можно растворить в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

Дети

Препарат применяют детям от рождения до 6 лет после консультации с врачом.

Передозировка

В случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции. При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться

к врачу.

Срок годности

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 150 таблеток во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ / Deutsche
Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия / Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe,
Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).