

Состав

действующие вещества:

1 мл капле содержит настойки плодов боярышника измельченных (*Crataegi fructus*) (1:10) (экстрагент - этанол 70%) 0,275 мл, настойки валерианы корней (*Valerianae radix*) (1: 5) (экстрагент - этанол 70%) 0,295 мл, настойки травы пустырника (*Leonuri herba*) (1: 5) (экстрагент - этанол 70%) 0,43 мл.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: жидкость от желтовато-коричневого до коричневатого цвета с запахом валерианы. При хранении возможно образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Снотворные и седативные средства. Код АТХ N05C M.

Фармакодинамика

Действие лекарственного средства обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав. Биологически активные вещества валерианы корней и травы пустырника (эфирные масла, сапонины, алкалоиды, дубильные вещества) благоприятно влияют на функциональную активность центральной и вегетативной нервной системы, проявляя преимущественно седативное, анксиолитическое и спазмолитическое действие; регулируют сердечную деятельность, снижают артериальное давление и частоту сердечных сокращений, подавляют чувство страха, психическое напряжение, улучшают засыпание и структуру сна. Биологически активные вещества плодов боярышника (флавоноиды, холин, ацетилхолин, фитостерины, тритерпеновые кислоты) способны усиливать кровообращение в коронарных и мозговых сосудах, увеличивать сократимость миокарда (легкий положительный инотропный эффект) и уменьшать его возбудимость (отрицательный батмотропный эффект). Биологически активные вещества плодов боярышника способствуют повышению толерантности миокарда к гипоксии, снижают периферическое сосудистое сопротивление и улучшают выносливость сердца к физическим нагрузкам, оказывают антиаритмическое, гипотензивное, гипохолистеринемическое действие.

Лекарственное средство обладает способностью усиливать действие других седативных и снотворных средств.

Фармакокинетика

Не исследовалась.

Показания

Легкие формы невротических расстройств, сопровождающихся раздражительностью, тревожностью, чувством страха, подавленностью, повышенной утомляемостью, рассеянностью, повышенной нервной возбудимостью; легкие формы расстройств сна, связанные с возбуждением; приступы головной боли, обусловленные нервным напряжением; легкие формы дисменореи. Применять в комплексной терапии климактерического синдрома.

Нейроциркуляторная дистония с тахикардией, кардиалгией и артериальной гипертензией; артериальная гипертензия I стадии. Применять в составе комплексной терапии и для профилактики хронической ишемической болезни сердца, атеросклероза, артериальной гипертензии, начальных стадий хронической сердечной недостаточности.

Постоянное психическое напряжение.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженная артериальная гипотензия, выраженная брадикардия, депрессия и другие заболевания, сопровождающиеся угнетением деятельности центральной нервной системы; период беременности и кормления грудью язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; цирроз печени алкоголизм в анамнезе одновременное применение препаратов, содержащих алкоголь.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Если пациент принимает любые другие лекарственные средства, обязательно следует сообщить об этом врачу.

Лекарственное средство усиливает активность сердечных гликозидов (дигоксина), а также действие спазмолитиков, транквилизаторов, нейролептиков, снотворных и успокаивающих средств. Не следует применять препарат вместе с антиаритмическими средствами III поколения, а также

другими средствами, которые могут уменьшать или увеличивать частоту сердечных сокращений.

Препарат может усиливать фармакологические эффекты анальгетических, сердечных и антигипертензивных лекарственных средств, а также усиливает действие алкоголя.

Прием с солями алкалоидов не рекомендуется в связи с возможностью образования отрицательных комплексов. Не следует применять препарат вместе с цизапридом.

Особенности применения

В период применения лекарственного средства СЕДАФИТОН, капли оральные, следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков. Препарат не рекомендуется применять во время еды, чтобы избежать взаимодействия с компонентами пищи.

Лекарственное средство содержит этанол! Не рекомендуется применять в течение длительного времени.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

При применении лекарственного средства следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение противопоказано.

Способ применения и дозы

Лекарственное средство применять внутрь. Назначать *взрослым* по 20-50 капель 3 раза в день до еды.

Детям старше 12 лет - из расчета 1 капля на 1 год жизни, разведя с небольшим количеством воды, 3 раза в день за 10-20 минут до еды.

При необходимости препарат принимают с небольшим количеством воды или на кусочке сахара (под язык).

Продолжительность курса лечения определяется индивидуально для каждого пациента с учетом характера, степени тяжести патологического процесса, особенностей течения заболевания, переносимости лекарственного средства и стабильности достигнутого лечебного эффекта.

Дети

Не применять детям до 12 лет.

Передозировка

Симптомы: головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, вялость, подавленность, слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, сонливость, боль в животе, тошнота, тремор рук, расширение зрачков, ощущение сжатия в груди, брадикардия, снижение артериального давления, снижение остроты зрения и слуха, усиленное сердцебиение, психическое возбуждение.

Лечение: немедленное прекращение применения лекарственного средства и вовремя принятые меры экстренной помощи (промывание желудка, введение активированного угля и десенсибилизирующее средств), симптоматическое лечение способствуют быстрому устранению клинических проявлений передозировки.

Побочные реакции

Аллергические реакции: у пациентов с индивидуальной повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможно развитие аллергических реакций, включая такие симптомы, как сыпь, зуд, гиперемия и отеки кожи, крапивница.

Со стороны нервной системы: головокружение, сонливость, общая слабость, депрессия, угнетение эмоциональных реакций.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможны тахикардия или брадикардия, снижение артериального давления, значительное замедление сердечного ритма.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, спастические боли в животе, диспепсия.

Общие нарушения: ощущение усталости, снижение умственной и физической работоспособности, отек.

В случае возникновения любых негативных эффектов следует обязательно посоветоваться с врачом относительно дальнейшего применения лекарственного средства!

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл, стеклянных, с пробками-капельницами, крышками полимерными с контролем первого вскрытия, по 1 флакону в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).