

Состав

действующие вещества: 2,2 мл раствора содержат: Acidum phosphoricum D10 - 22 мг, Aconitum napellus D6 - 22 мг, Aesculus hippocastanum D4 - 22 мг, Ambra grisea D10 - 22 мг, Anamirta cocculus D4 - 22 мг, Arnica montana D28 - 22 мг, Bothrops lanceolatus D10 - 22 мг, Cerebrum suis D8 - 22 мг, Cinchona pubescens D4 - 22 мг, Conium maculatum D4 - 22 мг, Embryo totalis suis D10 - 22 мг, Gelsemium sempervirens D4 - 22 мг, Hepar suis D10 - 22 мг, Hyoscyamus niger D6 - 22 мг, Kalium bichromicum D8 - 22 мг, Kalium phosphoricum D6 - 22 мг, Magnesium phosphoricum D10 - 22 мг, Manganum phosphoricum D8 - 22 мг, Medorrhinum Nosode D13 - 22 мг, Placenta totalis suis D10 - 22 мг, Ruta graveolens D4 - 22 мг, Selenium D10 - 22 мг, Semecarpus anacardium D6 - 22 мг, Strychnos ignatii D8 - 22 мг, Sulfur D10 - 22 мг, Thuja occidentalis D6 - 22 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость без запаха и практически свободен от частиц.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Для гомеопатических препаратов не определяется.

Показания

Комплексное лечение заболеваний нервной системы функционального и органического происхождения: повышенного психического напряжения, раздражительности, невротических реакций, состояний после физического и психического истощения симптомов тревоги и двигательного беспокойства; сотрясения головного мозга, энцефалопатии различного происхождения; психозов, абстинентного синдрома и алкогольного делирия; задержки умственного и физического развития у детей, неврозов, депрессий; нейроциркуляторной дистонии, состояния после инсульта, артериосклероза; детского церебрального паралича, болезни Паркинсона, рассеянного склероза,

расстройств памяти, в т. ч. гериатрических изменений.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, к растениям семейства сложноцветных. Гиперчувствительность к хинина.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Совместим с другими лекарственными средствами.

Особенности применения

Если симптомы не исчезают или состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Токсичность в период беременности и кормления грудью гомеопатически разведенных веществ, входящих в состав данного лекарственного средства, не установлена.

Ни о каких нежелательных реакциях не сообщалось.

Вопрос о целесообразности применения препарата беременным и кормящим грудью, решает врач индивидуально, с учетом польза/риск.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 12 лет - 2,2 мл, детям в возрасте от 3 до 6 лет - 1 мл, от 6 до 12 лет - 1,5 мл. Применять разовую дозу 1-3 раза в неделю в виде внутримышечных, подкожных, внутрикожных, внутривенных (струйно) инъекций, а также в акупунктурные точки.

Курс лечения - 3-6 недель.

Дети

Препарат рекомендован для применения детям от 3 лет.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, лихорадка, зуд, изменения в месте введения.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

Упаковка

5 ампул по 2,2 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).