

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит 3,2 мг сухого экстракта (4-9: 1) из смеси сырья: корневищ баптизии красильной (*Baptisia tinctoria* L) корня эхинацеи пурпурной (*Echinacea purpurea* Moench) корней эхинацеи палиды (*Echinacea pallida* Nutt) молодых побегов и листьев туи (*Thuja occidentalis* L.);

Экстрагент: этанол 30% (об / об);

вспомогательные вещества: лактоза макрогол 6000; магния стеарат сахароза.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: от бежевого до светло-коричневого, округлые, несколько выпуклые с обеих сторон таблетки диаметром примерно 9 мм, толщиной примерно 4 мм, без риска для деления.

Фармакотерапевтическая группа

Другие иммуностимуляторы. Код АТХ L03A X.

Фармакодинамика

В различных доклинических моделях в разных местах действия Эсберитокс демонстрирует стимулирования иммунной системы.

В случае вирусных простудных заболеваний, клиническая стимуляция защитных сил организма проявляется в облегчении симптомов и сокращении продолжительности заболевания.

Фармакокинетика

Невозможно четко отнести соответствующие фармакодинамические результаты в отдельно определенных компонентов, поскольку Эсберитокс, таблетки - это комплексная смесь нескольких растительных веществ. Информация о фармакокинетике препарата отсутствует.

Показания

Для укрепления сопротивляемости организма как поддерживающая терапия при комплексном лечении вирусных простудных заболеваний.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных компонентов препарата. Не следует применять препарат больным с прогрессирующими системными заболеваниями (туберкулез и саркоидоз) при аутоиммунных заболеваниях (коллагенозы, рассеянный склероз) при иммунодефицитных состояниях (СПИД, ВИЧ-инфекции); при иммуносупрессорных состояниях, вызванных применением цитостатических препаратов или иммуносупрессоров, например, после трансплантации при гематологических заболеваниях (лейкемия, агранулоцитоз).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие с другими лекарственными средствами неизвестно.

Соответствующие исследования по взаимодействию с другими лекарственными средствами не проводились.

Особенности применения

В случае, если симптомы заболевания усиливаются или продолжаются дольше, чем 10 дней, или возникла одышка, лихорадка, гнойные или кровянистые выделения, следует обратиться к врачу.

Пациентам, страдающим редкой наследственной непереносимостью галактозы, наследственную непереносимость фруктозы, дефицит сахараз изомальтазы, дефицит лактазы или нарушением всасывания глюкозы и галактозы, не следует применять Эсберитокс, таблетки.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Недостаточно данных по применению препарата Эсберитокс беременным женщинам. Репродуктивная токсичность препарата недостаточно изучена при исследованиях на животных. Поскольку безопасность применения Эсберитокс, таблетки в течение беременности не доказана, препарат следует принимать после тщательной оценки соотношения польза для матери / риск для плода (ребенка).

Отсутствует информация о выводе определенных компонентов препарата Эсберитокс с грудным молоком матери и их негативного влияния на младенца, которое кормят грудью. Предупреждение: Эсберитокс, таблетки не следует принимать в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет принимать 3 раза в сутки по 4 - 6 таблеток.

Детям в возрасте от 7 до 11 лет: 3 раза в сутки по 2 - 3 таблетки.

Детям в возрасте от 4 до 6 лет: 3 раза в сутки по 1 - 2 таблетки.

Эсберитокс, таблетки нельзя принимать детям до 4 лет из-за недостаточности данных по безопасности препарата.

Нет данных о конкретных рекомендациях дозирования при нарушениях функции почек / печени.

Таблетки запивать большим количеством жидкости, желательно водой или растворять в ротовой полости утром, в обед и вечером.

Продолжительность приема зависит от протекания основного заболевания. Лечение нужно начинать сразу после появления симптомов и продолжать до их исчезновения. Эсберитокс, таблетки не следует применять дольше 10 дней.

Дети

Препарат предназначен для детей от 4 лет.

Передозировка

Передозировка не наблюдалась.

Побочные реакции

Оценка побочных эффектов основывается на таких показателях частоты:

- очень часто $\geq 1/10$;
- часто: $\geq 1/100$ до $<1/10$;
- нечасто $\geq 1 / 1,000$ до $<1/100$;
- редко $\geq 1 / 10,000$ до $<1 / 1,000$;
- очень редко $<1 / 10,000$;
- неизвестно: частота не может быть установлена из доступных данных.

Со стороны иммунной системы:

Реакции повышенной чувствительности, включая сыпь, зуд, отек лица, одышка, снижение артериального давления.

Со стороны желудочно-кишечного тракта:

Боль в животе, рвота, диарея.

Общие нарушения:

Головокружение.

Данные о частоте отсутствуют.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 ° C. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Шапер & Брюммер ГмбХ & Ко. КГ. Банхофштрассе, 35, 38259 Зальцгиттер, Германия.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Банхофштрассе, 35, 38259 Зальцгиттер, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника —

Государственного реестра лекарственных средств Украины.