

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит Atropinum sulfuricum D5 12,5 мг Hepar sulfuris D3 10 мг Kalium bichromicum D4 50 мг Silicea D2 5 мг Mercurius bijodatus D8 25 мг;

вспомогательные вещества: лактоза, сахароза, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: белого или почти белого цвета, иногда с отдельными темными точками, двухплоскостных таблетки со скошенной кромкой, без запаха или с легким запахом серы.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Комбинация из пяти гомеопатических монокомпонентов стимулирует собственные защитные механизмы организма при вирусных и бактериальных инфекциях глотки на различных стадиях воспаления.

Показания

Острый тонзиллит (катаральная и лакунарная ангина), хронический или рецидивирующий острый тонзиллит, увеличение (гиперплазия) миндалин, а также симптоматическое лечение после оперативного удаления миндалин у детей и взрослых.

Противопоказания

Не применять при гиперчувствительности к хрому или к другим компонентам препарата. При заболеваниях щитовидной железы (гипертиреоз) препарат принимать только по назначению врача.

Препарат противопоказан детям до 2 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Примечание: вредные привычки, такие как употребление стимуляторов, алкоголя, табакокурения, могут негативно влиять на действие гомеопатических лекарственных средств.

Особенности применения

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение. В этом случае пациенту нужно прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит сахарозу, что следует учитывать пациентам, больным сахарным диабетом.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

Если острое состояние не улучшается или ухудшается в течение первых 2 дней лечения, если появляются дополнительные жалобы, например температура тела выше 39 °С, следует проконсультироваться с врачом.

Поскольку препарат содержит сахарозу, его не следует применять пациентам с редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость фруктозы или недостаточность сахараз-изомальтазы.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Тонзилотрен в период беременности и кормления грудью назначает врач только после тщательной оценки соотношения пользы для матери/риск для плода (ребенка).

Способ применения и дозы

Взрослые и дети старше 12 лет:

- *при острых состояниях:* принимать по 1 таблетке каждый час, максимум 12 таблеток в сутки до улучшения;
- *при дальнейшем лечении или при хронических состояниях:* по 1-2 таблетки 3 раза в день до полного выздоровления.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет

- *при острых состояниях:* принимать по 1 таблетке через каждые 2 часа, максимум 6 таблеток в сутки до улучшения;
- *при дальнейшем лечении или при хронических состояниях:* по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.

Детям в возрасте от 2 до 6 лет:

- *при острых состояниях и при дальнейшем лечении или при хронических состояниях:* принимать по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Взрослым и детям при увеличении небных миндалин: принимать по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Если после завершения 8 дней лечения не наблюдается улучшения, то следует проконсультироваться с врачом.

Таблетки следует принимать за 30 минут до или через 30 минут после еды, медленно рассасывая их во рту.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат назначать детям в возрасте от 2 лет.

Передозировка

Не установлено.

Побочные реакции

После применения возможно повышенное слюноотделение. В этом случае дозу нужно уменьшить или прекратить прием препарата. При возникновении аллергических реакций со стороны кожи, таких как покраснение кожи, сыпь,

следует прекратить прием препарата. В редких случаях возможно возникновение боли в эпигастрии и тошноты.

При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в сухом, недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Оттоштрассе 24 76227 Карлсруэ, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).