

Состав

действующее вещество: вода для инъекций;

1 ампула содержит воды для инъекций 2 мл или 5 мл, или 10 мл.

Лекарственная форма

Растворитель для парентерального применения.

Основные физико-химические свойства: бесцветная, прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Растворители и средства разведения. Код АТХ V07A B.

Фармакодинамика

Вода для инъекций апиrogenна, химически не активна, не имеет фармакологического действия.

Показания

Вода для инъекций применяется для приготовления стерильных растворов лекарственных и диагностических средств, предназначенных для подкожного, внутримышечного, внутривенного введения.

Противопоказания

Вода для инъекций в качестве растворителя лекарственных и диагностических препаратов не применяется, если в инструкции по медицинскому применению препарата указан другой растворитель.

Не применять препарат для промывания глаз при офтальмологических операциях.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Вода для инъекций не проявляет фармакологического или химического взаимодействия с лекарственными и диагностическими средствами, предназначенными для подкожного, внутримышечного или внутривенного

введения.

Особенности применения

Вода для инъекций предназначена только для приготовления стерильных растворов лекарственных и диагностических средств, предназначенных для подкожного, внутримышечного или внутривенного введения, в способе применения которых предусмотрено применение воды для инъекций.

Воду для инъекций нельзя непосредственно вводить внутрисосудисто в связи с риском возникновения гемолиза из-за низкого осмотического давления!

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применяют в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Приготовление растворов лекарственных и диагностических средств с использованием воды для инъекций осуществляется в асептических условиях (открытие ампул, наполнение водой шприца и емкостей с лекарственными средствами). Количество воды для инъекций с целью приготовления раствора лекарственного средства определяется инструкцией по медицинскому применению последнего.

Дети

Применяют в педиатрической практике.

Передозировка

Не описана.

Побочные реакции

Не описаны.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

Упаковка

По 2 мл в ампулах. По 10 ампул в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).