

## **Состав**

*действующее вещество:* крапивы листья (Urticae folium)

1 пачка содержит крапивы листья (Urticae folium) - 50 г; 1 фильтр-пакет содержит крапивы листья (Urticae folium) - 1,5 г.

## **Лекарственная форма**

Листьев.

*Основные физико-химические свойства:*

измельченное сырье: кусочки листьев различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм. Цвет темно-зеленый. Запах слабый. Вкус горьковатый;

порошок крупный: кусочки листьев различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм. Цвет темно-зеленый. Запах слабый. Вкус горьковатый.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Гемостатические средства. Код АТХ В02В Х.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества препарата оказывают кровоостанавливающее, диуретическое, общеукрепляющее, противовоспалительное и сосудосуживающее действие, способствуют увеличению содержания гемоглобина и количества эритроцитов, нормализуют состав крови, снижают уровень сахара в крови, способствуют регенерации слизистых оболочек пищеварительного тракта, нормализуют липидный обмен.

## **Показания**

Легочные, кишечные, маточные, геморроидальные и другие кровотечения анемии различной этиологии; заболевания пищеварительного тракта (гастриты, колиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки).

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.  
Повышенная свертываемость крови кровотечения, вызванные кистой, полипами и другими опухолями матки и ее придатков; артериальная гипертензия.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не описано.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказан в период беременности. У женщин, которые кормят грудью, усиливает лактацию.

### **Способ применения и дозы**

2 десертные ложки листьев поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 минут. Охладить при комнатной температуре 45 минут, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 2-3 раза в день за 30 минут до еды: взрослым и детям старше 12 лет - по  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$  стакана, детям 5-7 лет - по 1 столовой ложке, детям 7-12 лет - по 2 столовые ложки.

Перед применением настой взболтать.

### **Дети**

Препарат применять детям в возрасте от 5 лет.

### **Передозировка**

Сообщение отсутствуют.

### **Побочные реакции**

Тошнота, рвота, диарея, боль в области желудка; аллергические реакции (включая гиперемию, сыпь, зуд, отек кожи).

**Срок годности**

2 года.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте; приготовленный настой - в прохладном месте не более 2 суток.

**Упаковка**

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

69050, Украина, г.. Запорожье, ул. Складская, 4.