

Состав

действующие вещества: бисглицинат железа - 10 мг, пирофосфат железа - 10 мг, сульфат железа - 10 мг, витамин С - 70 мг;

вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза - 225,25 (мг), дикальцийфосфат - 214,7(мг), гидроксипропилметилцеллюлоза - 70 (мг), моно- и диглицериды жирных кислот - 11,25 (мг), соли магния и жирные кислоты - 7,5 (мг), диоксид кремния - 3,75 (мг), натрия кроскармеллоза - 3 (мг), поливинилполипиролон - 3 (мг), желтый оксид железа - 2,5 (мг), красный оксид железа - 1,25 (мг).

Показания

КРОНОФЕР - рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания для профилактики и нивелирования железодефицитной анемии, которая возможна после разного рода кровотечений, травм, операций, гинекологических и других заболеваний, а также при повышенной потребности организма в железе, в том числе при беременности, в период лактации и у спортсменов.

Противопоказания

Не применять в случае индивидуальной чувствительности к компонентам.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; стеноз пищевода и/или другие обструктивные заболевания желудочно-кишечного тракта; дивертикул кишечника; кишечная непроходимость; состояния, сопровождающиеся повышенным накоплением железа (гемохроматоз, гемосидероз); другие виды анемии, не обусловленные дефицитом железа (гемолитическая анемия, В12-дефицитная анемия); склонность к тромбозам, тромбофлебит, тяжелые заболевания почек; одновременное применение парентеральных форм железа; сахарный диабет; мочекаменная болезнь (при применении аскорбиновой кислоты > 1 г (г)/сут).

Предостережение

Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. При потреблении рекомендовано применение полноценного и сбалансированного рациона питания. Диетическую добавку не следует применять как заменитель полноценного рациона питания.

Кронофер является эффективным только при дефиците железа и неэффективен при других видах анемии.

Биодоступность солей железа (II) может снижаться при взаимодействии с различными компонентами пищи и другими лекарственными препаратами (фитином, оксалатами, танинами, антацидами и др.), В связи с чем их назначают натощак.

Препараты железа с осторожностью применяют у лиц с такими заболеваниями, как лейкоз, хронические заболевания печени и почек, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания кишечника (энтерит, язвенный колит, болезнь Крона).

Железо снижает всасывание многих лекарств, таких, как хинолоновые антибиотики, тетрациклин, бисфосфонаты, леводопа, левотироксин, метилдопа, микофенолат мофетил и пеницилламин. Чтобы избежать этого, следует принимать железо за 2 часа до или через 2 часа после приема лекарства.

При использовании Кронофера кал может приобретать черный цвет.

Способ применения и дозы

Перорально принимать по 1 таблетке в день.

Дети

Употреблять Кронофер возможно детям от 14 лет.

Побочные реакции

Возможны тошнота, диарея, запор, боль в эпигастральной области, аллергические реакции, кристаллурия, повреждения инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия), тромбоцитоз, гиперпротромбинемия, эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз, повышенная возбудимость, нарушение сна, головная боль, нарушение обмена цинка и меди.

Срок годности

24 месяца от даты производства.

Не применять после истечения срока годности. Серия и срок годности указаны на упаковке.

Условия хранения

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Избегать воздействия источников тепла, прямого солнечного света и контакта с водой.

Упаковка

По 30 таблеток в блистерах в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

С.И.И.Т С.р.л, Виа Ариосто 50/60, 20090, Треzzано Сул Навильо (Ми), Италия
(SIIT Srl, Via Ariosto 50/60, 20090, Trezzano sul Naviglio (Mi) - Italy) .