

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 г сбора содержит брусники листья (*Vitis idaeae folia*) 500 мг, зверобоя травы (*Hyperici herba*) 200 мг, шиповника плодов (*Rosae fructus*) 200 мг, прицелы травы (*Bidentis herba*) 100 мг.

## **Лекарственная форма**

Сбор.

*Основные физико-химические свойства:* смесь неоднородных кусочков серовато-зеленого цвета с беловато-желтыми и коричневато-красными, коричневыми и темно-коричневыми вкраплениями.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Другие препараты для лечения урологических заболеваний. Код АТХ G04ВХ.

## **Фармакодинамика**

Лекарственное средство оказывает противомикробное действие в отношении стафилококка, кишечной палочки, синегнойной палочки, протей и других микроорганизмов, также противовоспалительное и диуретическое действие.

## **Показания**

В комплексной терапии острых и хронических заболеваний в урологии (цистит, уретрит, простатит), гинекологии (вагинит, вульвит неспецифической этиологии) и проктологии (проктит, воспаление геморроидальных узлов, анальные трещины, колиты).

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам сбора. Артериальная гипертензия, тромбофлебит и склонность к нему, недостаточность кровообращения, эндокардит, декомпенсированный сахарный диабет, тяжелые болезни почек, желчекаменная болезнь.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не рекомендуется применение больным, принимающим антикоагулянты, антибиотики, сульфаниламиды, противозачаточные, гипотензивные-блокаторы кальциевых каналов, женские половые гормоны, гипохолестеринемический средства (статины), сердечные гликозиды.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Информация об опыте применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствует. Необходима консультация врача.

### **Способ применения и дозы**

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой. Перед применением настой рекомендуется взболтать.

Внутренне принимать в теплом виде по  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$  стакана 3-4 раза в сутки; местно для микроклизм применяют теплый неразведенный настой по 25-50 мл для орошений, спринцеваний, ванночек, примочек настой разводят в 2-4 раза.

*В урологии* настой принимать внутрь по указанной схеме в течение 1-3 недель. При хроническом течении заболевания курс лечения может быть продлен до нескольких месяцев после консультации с врачом. Одновременно настой применять местно (микроклизмы) в течение 1-2 недель 1-2 раза в сутки.

*В гинекологии* настой принимать внутрь по указанной схеме в течение 2-4 недель и одновременно местно (ванночки, орошения, спринцевания, примочки, микроклизмы) 1-2 раза в сутки.

*В проктологии* настой применять в течение 1-3 недель одновременно внутрь по  $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$  стакана и в виде теплых примочек 1-3 раза в сутки и микроклизм по 50 мл на ночь. При колитах настой применять только внутрь.

Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2-8 °С) не более 2 суток.

### **Дети**

Препарат не применяют детям до 12 лет.

### **Передозировка**

Передозировка и длительное применение вызывает ощущение горечи во рту, неприятные ощущения в области печени. Возможно усиление побочных реакций.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница) фотосенсибилизация (во время лечения следует избегать УФ-излучения). Повышение артериального давления.

### **Срок годности**

3 года. Не применять после истечения срока годности.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 1,5 г в фильтр-пакете; по 20 фильтр-пакетов в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО «Лектравы».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.