

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 капсула содержит 50 мг урохолуму Экстракт, полученного из водно-спиртового экстракта (1:1) (экстрагент - этанол 40%) из смеси: моркови дикой плодов (*Dauci carotae fructus*) - 200 мг, ортосифона тычиночного листьев (*Orthosiphonis staminei Foli*) - 180 мг, спорыша травы (*Polygoni avicularis herba*) - 150 мг, кукурузы столбиков с рыльцами (*Zeaе maydis styli cum stigmatis*) - 120 мг, бузины черной цветков (*Sambuci nigrae flores*) - 100 мг, хвоща травы (*Equiseti herba*) - 100 мг, хмеля шишек (*Lupuli flos*) - 50 мг, березы почек (*Betulae gemmae*) - 50 мг, зверобоя травы (*Hyperici herba*) - 40 мг, мяты листья (*Menthae piperitae folia*) - 10 мг 2% мальтодекстрин;

*вспомогательные вещества:* лактоза, магния стеарат;

*капсула твердая желатиновая:* желатин, титана диоксид (E 171), железа оксид (E 172), азорубин (E 122), индиготин (E 132), синий патентованный V (E 131).

## **Лекарственная форма**

Капсулы.

*Основные физико-химические свойства:* твердые желатиновые капсулы с корпусом соломенного цвета и темно-зеленой крышечкой. Содержимое капсул - порошок от светло-желтого до коричневого цвета, содержащий небольшие дольки от светлого до темного цвета. Допускается наличие агломератов частиц.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые в урологии. Код АТХ G04B X.

## **Фармакодинамика**

Препарат растительного происхождения. Комплекс биологически активных веществ урохолум, легко всасываясь в кровь и стимулируя почечный и печеночный кровоток, способствует увеличению моче и желчеотделение, нормализует тонус гладкой мускулатуры верхних мочевыводящих путей и желчного пузыря, ослабляет воспалительные процессы, оказывает бактерицидное, диуретическое, желчегонное, спазмолитическое действие.

Урохолум оказывает антиазотемический эффект, выводит из организма мочевину, мочевую кислоту, хлориды. Способствует выведению песка и камней из почек, мочевого и желчного пузырей.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

Применять в составе комплексной терапии острых и хронических заболеваний (неспецифической инфекции) мочевыводящих путей (цистит, уретрит) и почек (пиелонефрит), хронических неинфекционных заболеваний почек (нефрит, нефроз) мочекаменной, почечнокаменной болезни и солевого диатеза (для профилактики образования конкрементов, в т. ч. после их удаления) хронического холецистита, дискинезии желчевыводящих путей.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Изменение реологических свойств крови, обтурационная желтуха.

### Особые меры безопасности.

С осторожностью применять пациентам с желудочно-пищеводного рефлюкса (из-за возможного возникновения или усиления изжоги).

Не применять лекарственное средство, если диаметр камней превышает 3 мм.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не установлена.

## **Особенности применения**

Капсула желатиновая содержит азорубин (Е 122), который может вызывать аллергические реакции.

Препарат содержит лактозу, поэтому, если у вас установлено непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не изучалась.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Препарат не применяют в период беременности и кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям старше 12 лет принимать перед едой по 1 капсуле трижды в сутки. Капсулы следует глотать не разжевывая, с достаточным количеством жидкости (например стакан воды). Курс лечения определяется врачом с учетом течения заболевания, характера сопутствующей терапии и длится от 5 дней до 1 месяца. По назначению врача курс терапии можно повторить.

## **Дети**

Препарат не применяют детям в возрасте до 12 лет.

## **Передозировка**

Усиление побочных реакций.

*Лечение:* при передозировке необходимо назначить большое количество теплого питья и провести симптоматическое лечение.

## **Побочные реакции**

*Со стороны нервной системы:* частота неизвестна - головокружение.

*Со стороны желудочно-кишечного тракта:* частота неизвестна - диспепсические явления (тошнота, рвота).

*Со стороны кожи и подкожной ткани:* частота неизвестна - аллергические реакции (в т. ч. сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи).

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 10 капсул в блистере, по 6 блистеров в коробке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).