

## **Состав**

*действующее вещество:* жидкий экстракт из смеси травы золотарника обыкновенного (*Solidago virgaurea L.*), травы лапчатки гусиной (*Potentilla anserina L.*), травы хвоща полевого (*Equisetum arvense L.*);

10 мл препарата содержат 7,9 мл жидкого экстракта (1 : 1,5–2,1) из смеси травы золотарника обыкновенного (*Solidago virgaurea L.*), травы лапчатки гусиной (*Potentilla anserina L.*), травы хвоща (*Equisetum arvense L.*) (4,2 : 1,4 : 1), экстрагент: этанол 50 % (об/об);

*вспомогательные вещества:* вода очищенная, этанол 96 %.

## **Лекарственная форма**

Капли оральные.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная жидкость коричневого цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые в урологии. Код АТХ G04В.

## **Фармакодинамика**

Исследования не проводились.

## **Фармакокинетика**

Исследования не проводились.

## **Показания**

- Острые и хронические инфекции мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит) легкой и средней степени тяжести в составе комплексной терапии.
- Профилактика образования камней в мочевом пузыре, в том числе и после их удаления.

## **Противопоказания**

- Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту лекарственного средства. Солидагорен не следует применять в случае аллергии на растения семейства астровых (*Asteraceae*), поскольку эти растения используют при производстве растительного экстракта, который входит в состав лекарственного средства.
- Тяжелая сердечная и почечная недостаточность, включая заболевания, при которых необходимо потреблять уменьшенное количество жидкости.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Случаи взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

Из-за наличия этанола в этом лекарственном средстве возможно влияние на действие других препаратов.

### **Особенности применения**

Противопоказано применять Солидагорен в качестве мочегонного средства для лечения отеков, вызванных сердечной или почечной недостаточностью, особенно у пожилых людей.

В случае появления крови в моче, высокой температуры тела или если симптомы заболевания сохраняются более 5 дней, рекомендуется обратиться к врачу.

Лекарственное средство содержит 45 % (об/об) спирта. С каждым приемом рекомендуемой дозы (30 капель) в организм попадает 0,6 г спирта. Поэтому данное лекарственное средство вредно для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным и женщинам, кормящим грудью, детям, пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

При соблюдении рекомендованных доз не влияет на скорость реакции.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Лекарственное средство не рекомендуется применять в период беременности и кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям в возрасте от 12 лет принимать внутрь по 20–30 капель Солидагорена со 100–200 мл воды 3 раза в день. 30 капель соответствуют 1,4 мл лекарственного средства.

Потребление жидкости в течение суток при приеме Солидагорена должно составлять не менее 1,5–2 л.

Длительность применения лекарственного средства определяется врачом и зависит от течения и тяжести заболевания. Если симптомы заболевания не уменьшаются, или возникают любые побочные реакции, необходимо прекратить применение этого лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.

## **Дети**

Лекарственное средство не рекомендуется применять детям в возрасте до 12 лет.

## **Передозировка**

Сообщения отсутствуют. В случае передозировки возможно усиление побочных реакций.

## **Побочные реакции**

Очень редко наблюдаются реакции гиперчувствительности и аллергические реакции. Возможны легкие желудочно-кишечные расстройства (частота неизвестна).

В случае появления первых признаков реакции гиперчувствительности (например сыпи) прием лекарственного средства следует прекратить.

В случае появления любых других побочных реакций следует проконсультироваться с врачом.

## **Срок годности**

3 года.

После вскрытия флакона – 3 месяца.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 50 мл во флаконе с капельницей по 1 флакону в коробке из картона.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/ Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия/ Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).