

## **Состав**

*1 таблетка содержит:* кукурузные рыльца, экстракт ортосифона тычиночного, экстракт толокнянки обыкновенной, экстракт клюквы, экстракт одуванчика лекарственного, экстракт черники обыкновенной, экстракт хвоща, цитрат магния, мальтодекстрин, целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза натрия оболочка (этилцеллюлоза, триглицериды средней цепи, олеиновая кислота, гидроксид аммония, натрия альгинат, гидроксипропилметилцеллюлоза), кремния диоксид, магния стеарат, стеариновая кислота, глицерин.

Пищевая (питательная) и энергетическая ценность (калорийность) НА 100 г: белки - 4,0 г, углеводы - 42,0 г, жиры - 3,7 г; 880 кДж / 210,37 ккал.

На 1 таблетку: белки - 0,04 г, углеводы - 0,42 г, жиры - 0,037 г 8,8 кДж / 2,1 ккал.

## **Показания**

Может быть рекомендована врачом для использования в рационах диетического питания как источник микроэлементов, биологически активных веществ растительного происхождения с целью общего укрепления организма и создания оптимальных диетологических условий обмена веществ, в частности как уросептики, мочегонные и противовоспалительные средства при острых и хронических воспалительных заболеваниях мочеполовой системы (уретрит, цистит, пиелонефрит, вульвит, вагинит), камней почки и камнях мочевого пузыря хронических вирусных гепатитах; при сердечно-сосудистой недостаточности II-III степени (вместе с сердечными гликозидами).

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам продукта; гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки на фоне повышенной кислотности желудочного сока повышенная свертываемость крови.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применение Нованефрон при беременности возможно только во II и III триместрах. Поскольку диетические добавки имеют свободное применение потребителями, нежелательно принимать беременным, кормящим и детям без рекомендации врача.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь, после еды по 1-2 таблетке два раза в день, утром и вечером, запивая достаточным количеством воды. Продолжительность приема 2-8 недель. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

Диетические добавки. Не содержит ГМО. Перед использованием рекомендуется консультация врача.

Не является лекарственным средством.

### **Побочные реакции**

Нованефрон обычно хорошо переносится. Редко: аллергические реакции, слабость.

### **Срок годности**

3 года от даты производства. Не применять после истечения срока годности.

### **Условия хранения**

Хранить в упаковке производителя при температуре не выше 25 ° С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 15 таблеток в блистере, по 2 блистера вместе с листком-вкладышем в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

«NOVATOR PHARMA», Великобритания. ПРИМЕА ЛИМИТЕД, 20-22 Венлок Роуд,  
Лондон, Англия, №1.