

Состав

действующие вещества: 2,2 мл раствора содержат: Acidum ascorbicum D6 - 22 мг, Caladium seguinum D6 - 22 мг, Conium maculatum D28 - 22 мг, Cor suis D8 - 22 мг, Cortisonum aceticum D13 - 22 мг, Curare D8 - 22 мг, Damiana D8 - 22 мг, Diencephalon suis D10 - 22 мг, Embryo totalis suis D8 - 22 мг, Ferrum phosphoricum D10 - 22 мг, Glandula suprarenalis suis D13 - 22 мг, Kalium picricum D6 - 22 мг, Lycopodium clavatum D28 - 22 мг, Lytta vesicatoria D8 - 22 мг, Magnesium phosphoricum D10 - 22 мг, Manganum phosphoricum D8 - 22 мг, Panax ginseng D4 - 22 мг, Phosphorus D8 - 22 мг, Selenium D10 - 22 мг, Strychninum phosphoricum D6 - 22 мг, Testis suis D4 - 22 мг, Vitex agnus-castus D6 - 22 мг, Zincum metallicum D10 - 22 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Лекарственное средство регулирует функцию половых желез у мужчин, оказывает противовоспалительное, сосудорасширяющее и метаболическое действие, что базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в его состав.

Фармакокинетика

Для гомеопатических препаратов не определяется.

Показания

Недостаточность функции мужских половых желез при импотенции, простатите, хроническом уретрите, доброкачественной гиперплазии предстательной железы,

нарушении обмена веществ, адипозогенитальный дистрофии, преждевременного семяизвержения, ночном энурезе, прогрессирующей мышечной дистрофии, пластическом затвердевании полового члена, остеомалации, сахарном диабете.

Противопоказания

Гиперчувствительность к чужеродному животному протеину.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Совместим с другими лекарственными средствами.

Особенности применения

Если симптомы не исчезают или состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободный от натрия.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Лекарственное средство применять исключительно для лечения мужчин.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 12 лет - 2,2 мл. Применять разовую дозу 2-3 раза в неделю, при остром состоянии - ежедневно в течение 3 дней, дальше продолжать, как обычно, применяя разовую дозу 2-3 раза в неделю в виде внутримышечных, подкожных, внутрикожных, внутривенных (струйно) инъекций, а также в акупунктурные точки.

Курс лечения - 3-6 недель.

Дети

Принадлежащий задокументирован опыт применения данного лекарственного средства у детей отсутствует, поэтому не следует назначать детям до 12 лет.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

В редких случаях могут возникать реакции гиперчувствительности (или даже анафилактические реакции) при внутривенном введении чужеродных белков в концентрации выше D10.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

5 ампул по 2,2 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).