

Состав

действующие вещества: 2,2 мл раствора содержат: Acidum arsenicosum D28 - 22 мг, Apisinum D8 - 22 мг, Argentum nitricum D6 - 22 мг, Baptisia tinctoria D4 - 22 мг, Barosma D8 - 22 мг, Berberis vulgaris D4 - 22 мг, Capsicum annuum D6 - 22 мг, Chondrodendron tomentosum D6 - 22 мг, Colibacillinum Nosode D13 - 22 мг, Coxsackie Virus A9 Nosode D8 - 22 мг, Cuprum sulfuricum D6 - 22 мг, Equisetum hiemale D4 - 22 мг, Hepar sulfuris D10 - 22 мг, Hydrargyrum bichloratum D8 - 22 мг, Lytta vesicatoria D6 - 22 мг, Natrium pyruvicum D10 - 22 мг, Orthosiphon aristatus D6 - 22 мг, Pyelon suis D10 - 22 мг, Pyrogenium Nosode D198 - 22 мг, Smilax D6 - 22 мг, Solidago virgaurea D3 - 22 мг, Terebinthina laricina D6 - 22 мг, Ureter suis D10 - 22 мг, Urethra suis D10 - 22 мг, Vesica urinaria suis D8 - 22 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Лекарственное средство оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее, репаративное, диуретическое, спазмолитическое и антисептическое действие. Действие препарата основано на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в его состав.

Показания

В комплексном лечении подострых и хронических заболеваний почек и мочевыводящих путей, таких как цистит, цистопиелит, мочекаменная болезнь, гидронефроз; Ночной энурез, дизурия при I стадии аденомы простаты, сужение мочеиспускательного канала артериальная гипертензия при остром гломерулонефрите; для стимуляции экскреторных функций почек, в т. ч. в

случае гипергидроза.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно. При применении любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом относительно возможности одновременного применения.

Особенности применения

Если симптомы не исчезают или состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.

Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободный от натрия.

В начале лечения возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение лекарственного средства следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Вопрос о целесообразности применения лекарственного средства беременным и кормящим грудью, решает индивидуально врач с учетом риска/пользы.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 6 лет - 1 ампула по 2,2 мл. Применять в виде внутримышечных, подкожных, внутрикожных, а при необходимости - внутривенных инъекций 1-3 раза в неделю.

Курс лечения - 4-6 недель.

Как открыть ампулу

Открывать осторожно.

Разрезать стеклянную ампулу не обязательно. Держите ампулу верхней частью вверх под наклоном; жидкость, которая находится в верхней части ампулы, встряхните вниз. Отломите верхнюю часть ампулы, где находится цветная отметка.

Неиспользованный остаток раствора вылить.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 6 лет.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

В отдельных случаях через индивидуальную чувствительность к компонентам препарата *Solidago virgaurea* (золотарник обыкновенный) возможно повышенное слюноотделение. В таком случае прием препарата следует временно прекратить до исчезновения проявлений аллергической реакции. В редких случаях могут возникать реакции гиперчувствительности (до анафилактической реакции).

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня указанного месяца.

Условия хранения

Специальных условий хранения не требует. Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

По 5 ампул по 2,2 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. -Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).