

Состав

действующие вещества: 1 капсула содержит спорыша обычного экстракта сухого (7,69:1) (экстрагент - вода очищенная) 75 мг, зверобоя экстракта сухого (9,26:1) (экстрагент - этанол 50%) 45 мг, хвоща полевого экстракта сухого (9,17:1) (экстрагент - этанол 50%) 37,5 мг, Ависан (12,5:1) (экстрагент - этанол 70%) 37,5 мг

вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный, кальция стеарат оболочка капсулы содержит индиго (E 132), хинолин желтый (E 104), титана диоксид (E 171), желатин.

Лекарственная форма

Капсулы.

Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы зеленого цвета. Содержимое капсулы - смесь гранул и порошка от светло-коричневого до темно-коричневого с зеленоватым оттенком цвета. Допускается наличие агломератов частиц порошка. На капсулу допускается наносить товарный знак предприятия - ЗТ.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, способствующие растворению мочевых конкрементов. Различные препараты, включая комбинации. Код АТХ G04B C.

Фармакодинамика

Лекарственное средство обладает спазмолитическим, диуретическим, обезболивающим и противовоспалительным действием, обладает антимикробными и антисептическими свойствами, регулирует минеральный обмен. Уменьшает частоту и интенсивность почечной колики, нормализует физико-химические показатели мочи, способствует восстановлению оптимальной уродинамики и гомеостаза мочи, уменьшает лейкоцитурию. Способствует вымыванию песка и мелких конкрементов, предупреждает увеличение конкрементов или появление новых. Препарат оказывает положительное влияние на состояние сперматогенеза в условиях экспериментального простатита (повышается концентрация сперматозоидов, длительность сохранения подвижности сперматозоидов и процент подвижных форм, уменьшается количество патологически измененных сперматозоидов, в

позитивном направлении изменяется кислотная и осмотическая резистентность).

Фармакокинетика

Не исследована.

Показания

- Лечение и профилактика мочекаменной болезни (наличие в почках и мочевыводящих путях первичных и рецидивирующих камней различной величины и локализации);
- осложнения, вызванные прохождением фрагментов камней после ударно-волновой литотрипсии;
- при почечной колике;
- профилактика образования мочевых конкрементов после их оперативного удаления и/или самостоятельного выхода;
- в комплексной поддерживающей терапии хронического пиелонефрита, хронических воспалительных заболеваний мочевых путей (цистит, уретрит) и при хроническом простатите.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- тромбофлебит;
- изменение реологических свойств крови;
- острые воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря; наличие в мочевыводящих путях камней размером более 6 мм;
- нефриты;
- нефроз;
- нефрозо-нефриты, гломерулонефрит;
- артериальная гипертензия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не рекомендуется применять пациентам, принимающим антикоагулянты, антибиотики, сульфаниламиды, противозачаточные, гипотензивные блокаторы кальциевых каналов, женские половые гормоны, гипохолестеринемические средства (статины), сердечные гликозиды.

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Лекарственное средство можно применять в комбинации с противомикробными средствами.

При возникновении следующих побочных реакций препарат необходимо принимать после еды, но его прием не следует прекращать. Для облегчения выведения конкрементов рекомендуется выпивать большое количество воды (1,5-2 л) в течение 2-3 часов.

При наличии у пациентов с мочекаменной болезнью выраженной пиурии показано назначение противомикробных средств.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат противопоказан в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

При мочекаменной болезни взрослым и детям старше 12 лет принимать препарат перед едой по 2 капсулы 3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения составляет 20-30 суток. После перерыва курс лечения можно повторить.

С целью профилактики рецидивов камнеобразования в почках и мочевыводящих путях после ударно-волновой литотрипсии препарат назначать по 2 капсулы 3 раза в сутки в течение 5-15 суток, а после оперативного удаления камней и/или их самостоятельного отхождения - по 2 капсулы 3 раза в сутки 1-2 месяцев. При почечной колике препарат принимать по 1-2 капсулы после устранения болевого синдрома обезболивающими средствами.

При хроническом пиелонефрите препарат применять параллельно с базовой терапией или после ее проведения в качестве монотерапии по 1 капсуле 3 раза в сутки перед едой в течение 3 недель. Курсы лечения (через 1-2 недели перерыва) можно повторять в течение 2-3 месяцев.

При хронических циститах, уретритах и простатитах препарат применять по 2 капсулы 3 раза в сутки в течение 21-28 суток. Курс можно повторять через 2 недели.

Количество курсов лечения и продолжительность устанавливает врач индивидуально в зависимости от состояния больного.

При необходимости применения препарата в малых дозах можно переходить на прием капсул Фитолит.

Дети

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Передозировка

Токсического действия препарата не отмечено. При однократном приеме более 20 капсул возможно усиление проявлений побочных реакций. Передозировка и длительное применение может вызвать ощущение горечи во рту, неприятные ощущения в области печени. В случае передозировки рекомендовано промывание желудка и прием активированного угля. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Препарат хорошо переносится больными и обычно не вызывает побочных реакций. Возможны слабые диспепсические явления в виде тошноты и ощущения дискомфорта в эпигастральной области, рвота, диарея, фотосенсибилизация, раздражение ткани почек (проявляется болью в пояснице и при завершении мочеиспускания), повышение артериального давления.

У лиц с повышенной чувствительностью возможно возникновение аллергических реакций (покраснение, сыпь, зуд).

У лиц с повышенной чувствительностью возможно возникновение аллергических реакций (включая покраснение, сыпь, зуд, отек). Длительное применение препарата может привести к дискорилизации зубной эмали и нарушения структуры костной ткани (остеопороза).

В случае возникновения любых нежелательных реакций следует обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 капсул в блистере; по 6 блистеров в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., Город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).