

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 капсула содержит спорыша обычного экстракта сухого (7,69:1) (экстрагент - вода очищенная) 50 мг, зверобоя экстракта сухого (9,26:1) (экстрагент - этанол 50%) 30 мг, хвоща полевого экстракта сухого (9,17:1) (экстрагент - этанол 50%) 25 мг, Ависан (12,5:1) (экстрагент - этанол 70%) 25 мг;

*вспомогательные вещества:* магния карбонат, сахар-песок, крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный, кремния диоксид модифицированный, кальция стеарат оболочка капсулы содержит хинолин желтый (E 104), эритрозин FD & C Red 3 (E 127), титана диоксид (E 171), желатин.

## **Лекарственная форма**

Капсулы.

*Основные физико-химические свойства:* твердые желатиновые капсулы желтого цвета. Содержимое капсулы - смесь гранул и порошка от светло-коричневого до темно-коричневого с зеленоватым оттенком цвета. Допускается наличие агломератов частиц порошка. На капсулу допускается наносить товарный знак предприятия - ЗТ.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые в урологии. Средства, способствующие растворению мочевых конкрементов. Код АТХ G04B C.

## **Фармакодинамика**

Комбинированное лекарственное средство, содержащее растительные экстракты.

Препарат обладает спазмолитическим, диуретическим, обезболивающим и противовоспалительным действием, обладает антимикробными и антисептическими свойствами, регулирует минеральный обмен. Уменьшает частоту и интенсивность почечной колики, нормализует физико-химические показатели мочи, восстанавливает оптимальную уродинамику и гомеостаз мочи, уменьшает лейкоцитурию. Способствует вымыванию песка и мелких конкрементов, предупреждает увеличение конкрементов или появление новых.

Препарат оказывает положительное влияние на состояние сперматогенеза в условиях экспериментального простатита (повышается концентрация сперматозоидов, длительность сохранения движения сперматозоидов и процент подвижных форм, уменьшается количество патологически измененных сперматозоидов, в позитивном направлении изменяется кислотная и осмотическая резистентность).

### **Фармакокинетика**

Не исследована.

### **Показания**

Лечение и профилактика мочекаменной болезни (наличие в почках и мочевыводящих путях первичных и рецидивирующих камней различной величины и локализации); осложнения, вызванные прохождением фрагментов камней после ударно-волновой литотрипсии; при почечной колике; профилактика образования мочевых конкрементов после их оперативного удаления и/или самостоятельного выхода; в составе комплексной поддерживающей терапии хронического пиелонефрита, хронических воспалительных заболеваний мочевых путей (цистит, уретрит) и при хроническом простатите.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тромбозы, изменение реологических свойств крови, острые воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря, наличие в мочевыводящих путях камней размером более 6 мм, нефриты, нефрозы, нефрозонофриты, гломерулонефрит, артериальная гипертензия.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не рекомендуется применять пациентам, принимающим антикоагулянты, антибиотики, сульфаниламиды, противозачаточные, гипотензивные блокаторы кальциевых каналов, женские половые гормоны, гипохолестеринемические средства (статины), сердечные гликозиды.

*В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.*

## **Особенности применения**

Препарат можно применять в комбинации с противомикробными средствами.

При возникновении следующих побочных реакций препарат необходимо принимать после еды, но его прием не следует прекращать. Для облегчения выведения конкрементов рекомендуется выпивать большое количество воды (1,5-2 л) в течение 2-3 часов.

Препарат содержит сахар. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

При наличии у пациентов с мочекаменной болезнью выраженной пиурии показано назначение противомикробных средств.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Данные отсутствуют.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Препарат противопоказан в период беременности. В случае необходимости применения препарата на период лечения следует прекратить кормление грудью.

## **Способ применения и дозы**

Принимать взрослым и детям старше 12 лет внутрь перед едой.

*Мочекаменная болезнь.* Принимать по 2-3 капсулы 3 раза в сутки.

Продолжительность курса лечения составляет 20-30 суток. После перерыва курс лечения можно повторить.

*Профилактика рецидивов образования конкрементов в почках и мочевыводящих путях после ударно-волновой литотрипсии.* Принимать по 2-3 капсулы 3 раза в сутки в течение 5-15 суток, а после оперативного удаления камней и/или их самостоятельного отхождения - по 2-3 капсулы 3 раза в сутки в течение 1-2 месяцев.

*Почечная колика.* Принимать по 2-3 капсулы после устранения болевого синдрома обезболивающими средствами.

*Хронический пиелонефрит.* Препарат принимать параллельно с базовой терапией или после ее проведения в качестве монотерапии по 2 капсулы 3 раза в сутки перед едой в течение 3 недель. Курсы лечения (через 1-2 недели перерыва) можно повторять в течение 2-3 месяцев, переходя на прием по 1-2 капсулы в сутки.

*Хронические циститы, уретриты и простатиты.* Принимать по 2-3 капсулы 3 раза в сутки в течение 21-28 суток. Курс можно повторять через 2 недели (по 2 капсулы 3 раза в сутки).

Количество курсов лечения и продолжительность устанавливает врач индивидуально в зависимости от состояния больного.

## **Дети**

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

## **Передозировка**

Токсического действия препарата не отмечено. При однократном приеме более 30 капсул возможно усиление проявлений побочных реакций. Передозировка и длительное применение может вызвать ощущение горечи во рту, неприятные ощущения в области печени. В случае передозировки рекомендовано промывание желудка и прием активированного угля. Лечение симптоматическое.

## **Побочные реакции**

Препарат хорошо переносится больными и обычно не вызывает побочных реакций. Возможны слабые диспепсические явления в виде тошноты и ощущения дискомфорта в эпигастральной области, рвота, диарея, фотосенсибилизация, раздражение ткани почек (проявляется болью в пояснице и при завершении мочеиспускания), повышение артериального давления.

У лиц с повышенной чувствительностью возможно возникновение аллергических реакций (включая покраснение, сыпь, зуд, отек). Длительный прием лекарственного средства может привести к дискорилизации зубной эмали и нарушения структуры костной ткани (остеопороза).

В случае возникновения любых нежелательных реакций следует обратиться к врачу.

## **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 10 капсул в блистере, по 6 блистеров в коробке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).