

Состав

действующие вещества: 10 г гранул: Berberis 200CH 20 мг; Colchicum 200CH 20 мг; Acidum oxalicum 200CH 20 мг; Acidum phosphoricum 200CH 20 мг; Colocynthis 200CH 20 мг;

вспомогательное вещество: сахар кондитерский.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Способствует растворению конкрементов и препятствует их образованию в моче. Оказывает спазмолитическое действие на мышцы мочевыводящих путей, уменьшает воспаление, облегчает боли, связанные с мочеиспусканием.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

В составе комплексного лечения: мочекаменная болезнь, мочекислый диатез, подагра, воспалительные заболевания мочевыводящих органов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно сочетание с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными, витаминами). Интервал между их приемами должен составлять не менее 30 мин.

Особенности применения

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять это лекарственное средство.

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества – сахара кондитерского – проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство, если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не исследовалось. Вопрос о целесообразности применения лекарственного средства беременным и кормящим грудью, врач решает индивидуально.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте от 12 лет – по 7 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте от 3 до 12 лет – по 3 гранулы на 1 прием, растворить в небольшом количестве воды или положить под язык. Гранулы принимать за 15–20 минут до еды или через 1 час после еды. Принимать 1 раз в сутки утром натощак в течение 2–3 месяцев. При необходимости курс лечения повторить после перерыва в 2–3 недели. При почечной колике – по 3 гранулы 3–5 раз в течение 1 часа.

Дети

Не назначают детям до 3 лет.

Передозировка

В большинстве случаев не приводит к негативным последствиям и не требует антидотной терапии, но у лиц с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного средства возможно усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Упаковка

По 10 г в пенале, по 1 пенала в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).