

Состав

действующее вещество: солодки корня экстракт сухой;

5 мл сиропа содержит солодки корня экстракта сухого (*Glycyrrhiza extractum siccum*) ((4,0-5,0): 1) (экстрагент-вода) (в пересчете на 8,0% содержание 18β-глицирризиновой кислоты) - 250 мг;

вспомогательные вещества: натрия бензоат (Е 211), калия сорбат, глицерин, сахароза, гидроксипропилцеллюлоза, кислота лимонная моногидрат, вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: вязкая жидкость бурого цвета, со специфическим запахом и вкусом.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях.
Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A.

Фармакодинамика

Корень солодки голой содержит глицирризин, калиевую и кальциевую соли глицирризиновой кислоты, флавоновые гликозиды (ликвиритин, ликвиритигенин, ликвиритозид). Отхаркивающее действие препаратов солодки связано с содержанием глицирризином, что стимулирует активность вейчатого эпителия трахеи и бронхов, усиливает секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

Спазмолитическое действие препарата на гладкие мышцы дыхательных путей обусловлена наличием флавоновых соединений, среди которых наиболее ликвиритозид; противовоспалительный (кортикостероидноподобный) эффект обусловлен наличием глицирризиновой кислоты, высвобождается при гидролизе глицирризином.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

В составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и затрудненным выделением мокроты (хронические и острые бронхиты, бронхопневмония, бронхоэктатическая болезнь).

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- нарушение функции печени и почек;
- гипокалиемия;
- артериальная гипертензия;
- тяжелая степень ожирения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Гипокалиемия (в результате чрезмерного применения корня солодки) может усиливаться при взаимодействии с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами и препаратами, которые влияют на сердечный ритм (например, хинидин).

При совместном применении с препаратами, которые определяют развитие гипокалиемии (тиазидные и петлевые диуретики, адренокортикостероидами и слабительные лекарственные средства), может быть нарушение электролитного баланса. Поэтому не следует применять длительное время Солодки корня сироп одновременно с вышеперечисленными лекарственными средствами.

Солодки корня сироп может противодействовать эффектам антигипертензивных препаратов.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

С осторожностью применять пациентам, больным сахарным диабетом, из-за содержания сахара в сиропе.

5 мл сиропа содержат 0,142 хлебных единиц.

Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени, это может привести к нарушению водно-солевого обмена, отеков.

Пациенты, принимающие Солодки корня сироп, не должны принимать другие продукты, содержащие солодку, поскольку могут возникнуть серьезные побочные явления, такие как задержка жидкости, гипокалиемия, гипертония, нарушения сердечного ритма.

Не рекомендуется одновременное применение с диуретиками, сердечными гликозидами, кортикостероидами, стимулирующими слабительными средствами или другими лекарствами, которые могут ухудшить электролитный дисбаланс (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Препарат содержит в своем составе калия сорбат, поэтому следует быть осторожным при применении у пациентов с нарушением функции почек или тем, кто придерживается диеты с контролируемым содержанием калия.

Препарат содержит в своем составе натрия бензоат (Е 211), поэтому следует быть осторожным при применении пациентам, которые придерживаются диеты с контролируемым содержанием натрия.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет на способность управлять автотранспортом и потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат противопоказан в период беременности, поскольку солодка повышает уровень эстрогенов, вследствие чего нарушается гормональный баланс. Стимулирует активность матки. В больших дозах оказывает эмбриотоксический эффект.

При необходимости приема препарата кормящим грудью, на период лечения кормление грудью следует прекратить.

Способ применения и дозы

Солодки корня сироп применять внутрь после еды 3-4 раза в сутки. Перед применением препарат не разводить, однако после приема запивая достаточным количеством жидкости (чая или теплой воды).

- Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать по 15 мл сиропа на прием;
- детям в возрасте от 1 до 3 лет - 2,5 мл на прием;
- детям в возрасте от 4 до 6 лет - 2,5-5 мл на прием;
- детям в возрасте от 7 до 9 лет - 5-7,5 мл на прием;
- детям в возрасте от 10 до 12 лет - 7,5-10 мл на прием.

Дозу измерять с помощью дозировочной ложки.

Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально для каждого пациента с учетом характера, степени тяжести и особенностей течения заболевания, стабильности достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.

Дети

Препарат назначать детям в возрасте от 1 года.

Передозировка

Сообщалось о случаях передозировки при длительном применении (более 4 недель) и/или приеме чрезмерных доз препаратов солодки с такими симптомами, как задержка жидкости, гипокалиемия, гипертония, нарушения сердечного ритма, гипертоническая энцефалопатия.

Возможно усиление побочных эффектов.

Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

При индивидуальной повышенной чувствительности возможно развитие аллергических реакций, включая сыпь, зуд, гиперемия кожи, отеки.

Длительное применение препаратов солодки в чрезмерных дозах может вызвать нарушение водно-электролитного баланса и привести к образованию отеков, развития гипокалиемии; в отдельных случаях возможны повышение артериального давления, гипокалиемическая миопатия и миоглобинурия.

В случае возникновения каких-либо нежелательных явлений пациенту необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу!

Срок годности

2 года. После первого вскрытия упаковки препарат можно применять в течение 6 месяцев при температуре хранения не выше 25 ° С.

Не следует применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 200 мл во флаконе, по 1 флакону с ложкой дозировочной в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр
«Борщаговский химико-фармацевтический завод».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 03134, г.. Киев, ул. Мира, 17.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).