

Состав

действующие вещества: 10 г гранул: Conium 1000CH 20 мг, Sabal serrulatum 50CH 20 мг, Thuja 1000CH 20 мг, Calcium fluoratum 200CH 20 мг, Pulsatilla 1000CH 20 мг;

вспомогательное вещество: сахар кондитерский.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Устраняет дизурические явления, улучшает выделение мочи. Способствует нормализации уровня общих эстрогенов и поддержанию половой функции. Препятствует росту аденомы.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

В составе комплексного лечения аденомы предстательной железы I-II степени.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно сочетание с любыми методами и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами).

Интервал между их приёмом должен составлять не менее 30 минут.

Особенности применения

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять это лекарственное средство.

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества – сахара кондитерского – проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство, если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Лекарственное средство не используют женщинам.

Способ применения и дозы

Взрослым следует принимать по 5 гранул под язык 1 раз в сутки в течение 2-2,5 месяцев, желательно в одно и то же время. Для достижения стойкого результата необходимо повторить курс лечения с интервалом в 2 недели.

Гранулы держать под языком, до полного рассасывания, принимать за 15-20 мин до еды или через 1 час после еды. При необходимости гранулы растворить в небольшом количестве воды.

Дети

Не назначают детям.

Передозировка

В большинстве случаев не приводит к негативным последствиям и не требует антидотной терапии, но у лиц с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного средства возможно усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 10 г в пенале/флаконе с крышкой; по 1 пеналу/флакону в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).