

## **Состав**

*действующие вещества:* 100 мл раствора содержат 100 мл водного экстракта (2: 1), полученного из смеси лекарственных растений: хвоща полевого стебля (*Equisetum arvense*) 570 мг, торичника красного растение (*Spergularia rubra*) 330 мг, Болд листьев (*Peumus boldus*) 280 мг, опунции (кактус) инжирного цветка (*Opuntia ficus-indica*) 170 мг, железный узколистный цветок (*Sideritis angustifolia*) 170 мг, розмарина аптечного листьев (*Rosmarinus officinalis*) 170 мг, пальчатник (бермудская трава) корни (*Cynodon dactylon*) 170 мг, мелиссы аптечной листьев (*Meliss Officiflis*) 170 мг экстрагент - вода.

*вспомогательные вещества:* натрия бензоат (E 211), калия сорбат, лимонная кислота, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Раствор оральный.

*Основные физико-химические свойства:* от бесцветного до слегка желтоватого цвета прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость со специфическим запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые в урологии. Различные препараты, включая комбинации. Код АТХ G04B X.

## **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат растительного происхождения. Имеет диуретическое, спазмолитическое, литолитическим, противовоспалительное, антибактериальное, желчегонное и антиоксидантный эффекты. Способствует элиминации из организма мочевой кислоты, токсинов и солей тяжелых металлов.

## **Фармакокинетика**

Неприменимо.

## **Показания**

В комплексной терапии: при уролитолизе (ураты, оксалаты, фосфаты, карбонаты), циститах, уретритах, спазмах мочевыводящих путей, синдроме раздраженного кишечника; для профилактики уролитолиза после литотрипсии.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна.

### **Особенности применения**

При воспалительных заболеваниях почек следует обязательно проконсультироваться с врачом. С осторожностью применять при наличии гастроэнтерита, при артериальной гипертензии, склонности к судорогам неэпилептического происхождения.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Поскольку безопасность использования хвоща полевого во время беременности окончательно не доказана, прием препарата беременными и женщинами, которые кормят грудью, возможно только при условии, что польза от его применения превышает риск.

### **Способ применения и дозы**

Препарат принимают внутрь 3 раза в день за 30 мин до еды.

Взрослые и дети старше 12 лет - по 45 мл 3 раза в сутки.

Дети 7-12 лет - по 15 мл 3 раза в сутки.

Дети 5-7 лет - по 5-10 мл 3 раза в сутки.

Беременные и женщины, которые кормят грудью - по 20 мл 3 раза в сутки.

Дозы и продолжительность лечения устанавливает врач индивидуально для каждого пациента.

Курс лечения обычно составляет 2-4 недели.

Если после 6 дней лечения состояние не улучшится, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Не рекомендуется принимать препарат в течение длительного времени. В случае пропуска приема очередной дозы не следует принимать двойную дозу препарата.

## **Дети**

Детям до 5 лет препарат не применяют.

## **Передозировка**

При применении в рекомендованных дозах передозировка не наблюдалось.

При случайной передозировке следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Симптоматическая терапия.

## **Побочные реакции**

Реакции повышенной чувствительности: аллергические реакции (гиперемия, зуд, сыпь, отек кожи).

В случае появления любых нежелательных реакций необходимо прекратить лечение и обратиться к врачу.

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 600 мл в полипропиленовой фляконе, по 1 флякону вместе с пластиковым мерным стаканчиком в картонной пачке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Мигуэль и Гаррига, С.Л.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

С/Хоакин Коста, 18-1, Монтгат, Барселона, 08390, Испания.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).