

Состав

действующее вещество:

1 суппозиторий содержит лиофилизированный из водного раствора экстракт предстательной железы быков, полученный путем экстракции, в пересчете на пептиды не менее 0,0024 г;

вспомогательные вещества: глицин, полисорбат 80, масло семян тыквы, твердый жир.

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные.

Основные физико-химические свойства: суппозитории от светло-желтого с зеленоватым оттенком до зеленого с желтоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые в урологии. Код АТХ G04В Х.

Фармакодинамика

Препарат применяют для лечения заболеваний предстательной железы. Экстракт предстательной железы быков, входящий в состав суппозитория, оказывает органотропное действие на предстательную железу (простатопротекторный эффект), противовоспалительное действие, уменьшая отек и лейкоцитарную инфильтрацию железы, улучшает процессы микроциркуляции и тромбоцитарно-сосудистую активность. Стимулирует активность гуморального звена иммунитета и некоторых факторов резистентности организма, влияет на тонус мышц мочевого пузыря, включая тонус детрузора.

Фармакокинетика

Компоненты препарата эффективно всасываются из прямой кишки. Экстракт предстательной железы быков расщепляется клеточными протеазами до аминокислот, не кумулируется. Экстракт предстательной железы быков и их метаболиты экскретируются с мочой.

Показания

- Хронический простатит;
- профилактика и лечение осложнений после операций на предстательной железе.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности к белкам крупного рогатого скота.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Лекарственное взаимодействие с препаратом ВИТАПРОСТ не изучалось.

Особенности применения

С осторожностью назначать при атеросклерозе, повышенном риске развития тромбозов. При длительном применении высоких доз необходимо контролировать время свертывания крови. При лечении препаратом рекомендуется проводить анализ клинических показателей активности предстательной железы (простатоспецифический антиген). Препарат практически свободен от натрия и калия.

После применения суппозитория следует тщательно вымыть руки.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Данные отсутствуют.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат не применяют для женщин.

Способ применения и дозы

Суппозиторий освобождают от упаковки и глубоко вводят в задний проход.

Применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 5-10 дней.

Продолжительность курса определяется характером и тяжестью заболевания, достигнутым терапевтическим эффектом, характером терапии (монотерапия или

комплексное лечение). При необходимости курс можно повторить через 1–6 мес.

Дети

Не использовать детям.

Передозировка

О случаях передозировки суппозиторий с экстрактом предстательной железы быков не сообщалось.

При применении высоких доз препарата (более 400 мг в сутки в течение длительного времени) возможны диспепсические расстройства, ощущение усталости, общая слабость, головные боли, креатинурия, повышение активности креатинкиназы, увеличение концентрации холестерина, триглицеридов, снижение концентрации тироксина и трийоды. содержания эстрогенов и андрогенов в моче. Специфического антидота нет. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Аллергические реакции: зуд, гиперемия кожи, кожная сыпь;

изменения в месте введения: чувство жжения.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света при температуре от 2 до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиторий в контурной ячейистой упаковке; по 2 контурных ячейистых упаковки в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ФЗ «БИОФАРМА».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 09100, Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Киевская, 37.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).