Состав

действующее вещество: солодки корни (*Glycyrrhizae radices*);

1 пачка содержит солодки корней (*Glycyrrhizae radices*) 100 г.

Лекарственная форма

Корни.

Основные физико-химические свойства: кусочки волокнистых корней различной формы светло-желтого, желтого, буровато-желтого цвета с коричневато-серыми, коричневыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05C A.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества корней проявляют отхаркивающие и обволакивающие свойства, смягчающие кашель; оказывают мочегонное, противовоспалительное, спазмолитическое, антигистаминное, противоязвенное действие.

Показания

Заболевания дыхательных путей (бронхит, пневмония, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь), воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря (пиелит, пиелонефрит, цистит), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным компонентам препарата. Органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), артериальная гипертензия, нарушение функции печени и почек; гипокалиемия тяжелая степень ожирения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Одновременное применение с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, адренокортикостероидами и слабительными средствами может усилить гипокалиемию.

Особенности применения

Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку корней поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 30 мин. Охладить при комнатной температуре 10 мин., процедить, остаток отжать в процеженного отвара. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде за 30 мин. до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по 1-2 столовой ложке 3-4 раза в сутки, детям 12-14 лет - по 1 столовой ложке 2-3 раза в сутки, 5-12 лет - по 1 десертной ложке 3-4 раза в сутки, 3-5 лет - по 1 десертной ложке 2-3 раза в сутки, 1-3 года - по 1 чайной ложке 2-3 раза в сутки. Перед применением отвар взболтать.

Приготовленную водную вытяжку хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента.

Дети

Применение препарата рекомендуется детям в возрасте от 1 года.

Передозировка

Передозировка и длительное применение (более 2 месяцев) может привести к нарушению водно-электролитного баланса, в результате чего возможно развитие гипокалиемический миопатии и миоглобинурии. Возможно усиление побочных эффектов.

Побочные реакции

Повышение артериального давления, гипокалиемия, аллергические реакции (в том числе сыпь, зуд, гиперемия кожи, образование отеков). При появлении побочных реакций препарат необходимо отменить и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО "Лектравы".

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.